

第六届全国医疗急救技能大赛理论题库

（1000 道复习题）

题型包括：A1 型题 500 题，A2 型题 50 题，A3/A4 型 50 题，
B 型题 100 题，X 型题 200 题，判断题 100 题。

一、A1 型题 500 题（即最佳回答题，它由一个叙述主体和五个备选答案组成，选项中只有一个是恰当的，其余四个答案为干扰答案）

1、杀灭物体上所有微生物的方法称为：(D)

A. 无菌操作 B. 无菌 C. 防腐 D. 灭菌 E. 消毒

2、小儿失钾的最重要原因是：(B)

A. 利尿药用量过大 B. 严重腹泻呕吐 C. 肾上腺皮质激素过多 D.
某些肾脏疾病 E. 经皮肤出汗失钾

3、影响中心静脉压高低的因素是：(D)

A. 外围静脉压和静脉血液阻力 B. 心脏射血能力和外围阻力 C. 动脉
血压和静脉血压 D. 心脏射血能力和静脉回心血量 E. 血管容量和循
环血量

4、最能反映组织性缺氧的血氧指标是：(B)

A. 血氧容量降低 B. 静脉血氧含量增加 C. 动脉血氧分压降低 D. 动脉血
氧含量降低 E. 动-静脉血氧含量差增大

5、对阻碍医师依法执业，侮辱、诽谤、威胁、殴打医师的人员进行

行政处罚时，应当适用（ D ）

- A. 《医师执业法》 B. 《医疗机构管理条例》
C. 《医疗事故处理条例》 D. 《治安管理处罚法》 E. 《刑法》

6、下列情况属于发热的是：（ E ）

- A. 甲状腺功能亢进引起的体温升高 B. 先天性汗腺缺乏引起的体温升高
C. 妊娠期出现的体温升高 D. 环境高温引起的体温升高 E. 抗原抗体复合物引起的体温升高

7、休克时正确的补液原则是：（ B ）

- A. 补液“宁多勿少” B. 需多少补多少 C. 补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体 D. 失多少补多少 E. 如血压正常不必补液

8、心力衰竭概念的主要内容是：（ C ）

- A. 心排血量绝对下降 B. 心排血量相对下降 C. 心排血量不能满足机体需要 D. 心肌收缩功能障碍 E. 心肌舒张功能障碍

9、基于突发公共卫生事件管理的信息，仅强调及时、不求准确全面的信息报告是（ B ）

- A. 发现报告 B. 初次报告 C. 进程报告 D. 结案报告 E. 以上都不对

10、心尖在胸前壁的体表投影位于：（ B ）

- A. 左侧第 4 肋间隙，距前正中线 7～9cm 处 B. 左侧第 5 肋间隙，距前正中线 7～9cm 处
C. 左侧第 5 肋间隙，距前正中线 6～9cm 处 D. 左侧第 5 肋间隙，距前正中线 5～7cm 处
E. 左侧第 6 肋间隙，距前正中线 5～7cm 处

11、门静脉由：（ A ）

A. 肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成 B. 肠系膜下静脉和脾静脉汇合而成
C. 脾静脉和胃左静脉汇合而成 D. 脾静脉和胃右静脉汇合而成
E. 肠系膜上静脉和胃左静脉汇合而成

12、动脉血压升高可导致:(D)

A. 心房收缩期延长 B. 心室舒张期延长 C. 心室射血相延长 D. 等容收缩相延长
E. 心室收缩期延长

13、导致心肌细胞自律性降低的因素是:(B)

A. 部分 Na 通道处于失活状态 B. 最大复极电位绝对值增大 C. 阈电位绝对值增大
D. 4 期自动除极速度增大 E. 心肌细胞直径增粗

14、分泌降钙素的细胞是:(C)

A. 小肠上部 K 细胞 B. 甲状旁腺细胞 C. 甲状腺 C 细胞 D. 胰岛 B 细胞
E. 胰岛 A 细胞

15、休克患者缺血性缺氧期微循环灌流的特点是:(B)

A. 少灌少流, 灌多于流 B. 少灌少流, 灌少于流 C. 多灌多流, 灌多于流
D. 少灌多流, 灌少于流 E. 多灌少流, 灌多于流

16、溶血性黄疸患者胆色素代谢特点是:(A)

A. 血清中非脂型胆红素浓度明显增高 B. 血清中脂型胆红素浓度明显增高
C. 进入肠内脂型胆红素减少 D. 尿中尿胆原显著减少 E. 尿中尿胆红素明显增多

17 接到 AFP 病例报告后, 县级疾病预防控制机构应在几小时内派出专业人员对病例开展调查, 在临床医生配合下, 详细填写“急性弛缓性麻痹病例个案调查表”: (D)

A、6 小时 B、12 小时 C、24 小时 D、48 小时 E 72 小时。

18、枕下棒击伤，当即昏迷，双侧瞳孔不等大，双侧肢体肌张力增高，双侧病理征阳性，头颅 CT 未见明显血肿，最可能的诊断：(C)

A. 脑挫裂伤 B. 脑震荡 C. 原发性脑干损伤 D. 小脑幕切迹疝 E. 弥散性轴索损伤

19、有关阑尾的描述，正确的是：(B)

A. 动脉来自肠系膜下动脉 B. 阑尾根部是 3 条结肠带集中处 C. 阑尾附于结肠起始部 D. 经阑尾孔开口于盲肠下端 E. 位于右髂窝，是腹膜间位器官

20、肝素有抗凝的作用，其主要机制是：(B)

A. 抑制血小板聚集 B. 增强抗凝血酶III活性 C. 促进纤维蛋白吸附凝血酶 D. 抑制因子 X 的激活 E 抑制凝血酶原的激活

21、抗利尿激素的作用主要是：(E)

A. 保钠、排钾、保水 B. 促进远曲小管对水的重吸收 C. 提高内髓部集合管对尿素的通透性 D. 增强髓袢升支粗段对 NaCl 的重吸收 E. 促进远曲小管集合管对水的重吸收

22、脑挫裂伤意识障碍下列哪项不正确：(B)

A. 程度和持续时间与脑挫裂伤部位相关 B. 中间清醒期是其特点 C. 多在半小时以上 D. 伤后立即出现 E. 程度和持续时间与脑挫裂伤程度相关

23、急性骨髓炎，骨膜下穿刺抽出脓液后。采取主要措施是：(C)

A. 联合应用大剂量有效抗生素 B. 用清热解毒中药治疗 C. 骨皮

质开窗引流 D. 局部石膏托固定 E. 降温补液，少量多次输血

24、肱骨髁上骨折并发正中神经损伤，会发生下列哪种畸形：(C)

A. 杵状指 B. 垂腕 C. 猿手畸形 D. 银叉畸形 E. 枪刺刀畸形

25、男性，20岁，枕部外伤2小时来院就诊。X线平片示枕骨骨折，行CT检查时突然呼吸停止，昏迷，双瞳等大。此时病人最可能出现的情况是：(E)

A. 休克 B. 原发性脑干损伤 C. 小脑幕切迹疝 D. 脑挫伤 E. 枕骨大孔疝

26、高钾血症的心电图特点是：(A)

A. T波高尖，QRS波群增宽 B. T波低平，Q-T间期缩短 C. T波低平，Q-T间期延长 D. T波正常，Q-T间期延长 E. T波低平，出现U波

27、某溃疡病并发幽门梗阻患者，因反复呕吐入院，血气分析结果：pH 7.49, PaCO₂ 48 mmHg, HCO₃⁻ 36 mmol/L。该患者应诊断为：(A)

A. 代谢性碱中毒 B. 代谢性酸中毒 C. 呼吸性酸中毒 D. 呼吸性碱中毒 E. 混合性碱中毒

28、下列患者对氧疗效果最好的是：(D)

A. 氰化物中毒 B. 心力衰竭 C. 一氧化碳中毒 D. 外呼吸功能障碍 E. 室间隔缺损伴有肺动脉狭窄

29、一工人上班骑自行车不慎跌倒，右颞部着地，当时昏迷达20分钟，醒后轻微头痛，四肢活动自如，次日感头痛加重，呕吐数次，伴嗜睡，来院就诊。首选何种检查：(A)

A. 头颅CT B. 头颅MRI C. 脑血管造影 D. 脑池造影 E. 腰穿检查

30、女性，13 岁。自幼发育差。突发头痛、呕吐一周。查体：体温 39℃，神清，颈强直，右侧肢体肌力Ⅳ级，肌张力高，心前区可闻杂音。初步考虑诊断为：(D)

A. 脑膜炎 B. 偏头痛 C. 脑肿瘤 D. 脑脓肿 E. 脑出血

31、成年女性，左手掌切割伤 2 小时，检查示指可主动屈伸，固定示指中节，远侧指间关节无屈曲运动，最可能的诊断是：(D)

A. 示指伸指肌腱断裂 B. 示指远侧指间关节损伤 C. 示指屈指浅肌腱断裂 D. 示指屈指深肌腱断裂 E. 示指屈指深浅肌腱均断裂

32、抑制肾小管重吸收水、钠的是：(E)

A. 肾素 B. 血管紧张素 C. 醛固酮 D. 抗利尿激素 E. 心房钠尿肽

33、中心性发绀常具有下列哪项特点：(D)

A. 常出现在肢体末梢 B. 伴有皮肤温度降低 C. 见于右心衰时
D. 见于发绀型先天性心脏病时 E. 见于严重休克时

34、药物的副反应是 (A)

A. 难以避免的 B. 较严重的药物不良反应
C. 剂量过大时产生的不良反应 D. 药物作用选择性

35、吸气性呼吸困难时，下列哪项叙述不正确：(B)

A. 吸气费力 B. 呼气时伴有哮鸣音 C. 常伴有干咳 D. 高调吸气性喉鸣 E. 重者出现吸气时“三凹症”

36、男，60 岁，咳嗽伴间歇性发热 1 月余，伴乏力消瘦，体格检查叩得右下肺浊音，下列情况可除外：(A)

A. 肺空洞 B. 肺癌 C. 肺炎 D. 胸腔积液 E. 胸膜增厚

- 37、区别腹部肿块来自腹腔或腹壁最简易的检查方法是：(C)
- A. 超声检查 B. 胃肠钡餐检查 C. 腹部体格检查 D. 腹部 X 线平片 E. 放射性核素检查
- 38、鉴别右心衰与肝硬化的主要特点是：(D)
- A. 有无腹水 B. 有无下肢水肿 C. 肝脏是否肿大 D. 颈静脉是否充盈 E. 有无脾脏肿大
- 39、腹部检查下列哪项错误：(B)
- A. 振水音见于幽门梗阻 B. 肋下扪及肝脏提示肝大 C. 脾脏正常时不能扪及 D. 肠鸣音消失可见于肠麻痹 E. 腹主动脉搏动正常人可触到
- 40、成年男性，车祸伤后 10 分钟，急救医师到现场后发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查的是：(A)
- A. 触诊足背和胫后动脉 B. 检查肢体感觉 C. 检查膝腱或跟腱反射 D. 足部主动活动有无缺失
- 41、内脏穿孔腹痛的性质：(A)
- A. 上腹刀割样痛伴肌紧张 B. 上腹烧灼痛伴反酸 C. 上腹钻顶样痛 D. 右上腹绞痛 E. 中上腹持续性剧痛，阵发性加剧
- 42、急性胰腺炎腹部压痛示：(E)
- A. McBurney 点压痛 B. Murphy 征阳性 C. 下腹正中压痛 D. 脐周压痛 E. 中上腹压痛
- 43、胸部冲击伤最严重的并发症是：(C)
- A. 血胸 B. 气胸 C. ARDS D. 肺不张 E. 肺破裂

44. 急性肺水肿叩诊呈:(C)

A. 过清音 B. 鼓音 C. 实音 D. 水泡音 E. 哮鸣音

45. 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于:(B)

A. 穿刺损伤肺组织 B. 抽液过多、过快, 胸膜腔内压突然下降
C. 胸膜超敏反映 D. 穿刺损伤肺血管 E. 空气栓塞

46. 有关骨折急救处理, 下列哪项错误:(E)

A. 首先应止血及包扎伤口 B. 无夹板时, 可用树枝、木棍(板)、
步枪等作临时固定支架 C. 可将伤员上肢缚于胸壁侧面, 下肢两
腿绑在一起固定 D. 脊椎骨折患者可采取手法复位 E. 搬动
脊椎骨折患者时, 应采取一人抱肩, 一人抬腿的方法

47. 慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肺源性心脏病、严重呼吸衰竭宜
采用:(A)

A. 低浓度给氧 B. 高浓度给氧 C. 两者均可 D. 两者均否

48. 急性呼吸窘迫综合症宜采用:(B)

A. 低浓度给氧 B. 高浓度给氧 C. 两者均可 D. 两者均否

49. 发生尖端扭转型室性心动过速宜选用以下哪种药物:(D)

A. 奎尼丁 B. 心律平 C. 胺碘酮
D. 利多卡因 E. 吡二丙胺

50. 急性肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要原因是:(A)

A. 肺毛细血管床减少 B. 肺小动脉炎 C. 血液粘度增加
D. 缺氧引起肺小动脉痉挛 E. 血容量增加

51. 突发事件的反应程度通常分为 (D) 级别。

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个 E 5 个

52、80 岁男性患者，1 月内突发晕厥 3 次，测心率为 43 次/分，可选用下列哪项最安全而简便的方法协助诊断：(B)

动态心电图 B. 阿托品心电图试验 C. 窦房传导时间测定 D. 希氏束心电图 E. 窦房结恢复时间测定

53、抢救霍乱最有效的措施是：(A)

A. 补充液体及电解质 B. 使用抗生素 C. 使用抑制肠黏膜分泌药
D. 利尿防治肾功能衰竭 E. 使用血管活性物质

54、糖尿病饮食治疗不包括哪项：(D)

A. 总热卡的确定 B. 营养成分的搭配 C. 三餐热量分配
D. 微量元素的分配 E. 忌食单糖类食品

55、判断胸外心脏按压是否有效最简便可靠的方法是：(A)

A. 触及大动脉搏动 B. 观察皮肤颜色 C. 观察尿量变化
D. 观察瞳孔 E. 观察神志

56、细菌性痢疾临床分型中哪项属急性：(D)

A. 慢性迁延型 B. 急性发作型 C. 慢性隐匿型 D. 中毒型 E. 静止型

57、洋地黄的主要适应证不包括哪项：(C)

A. 急、慢性充血性心力衰竭 B. 阵发性室上性心动过速 C. 房室传导阻滞 D. 心房扑动 E. 快速性心房颤动

58、下列哪种临床类型不属毒蕈中毒类型：(E)

A. 胃肠炎型 B. 神经型 C. 精神异常型 D. 溶血型
E. 肾坏死型

59、糖尿病酮症酸中毒抢救措施中哪项有错误:(D)

- A. 小剂量胰岛素持续静脉滴注 B. 根据失水程度补液 C. pH<7 时补碱 D. 昏迷时输高渗糖脱水 E. 尿量达 40mL/h 时补钾

60、尿毒症合并感染时, 下列抗生素哪种不宜使用:(B)

- A. 青霉素 B. 多黏菌素 C. 林可霉素 D. 红霉素 E. 头孢菌素

61、突发传染病疫情的现场控制措施错误的是:(B)

- A. 积极组织救治病人, 隔离传染源
B. 追踪密切接触者, 根据需要统一进行隔离、留验、医学观察和健康随访
C. 根据疫情规模和危害程度, 确定疫点、划分疫区
D. 采取消杀灭等卫生处理方法, 切断传播途径
E. 根据疾病的特点, 采取预防接种或预防服药, 宣传教育等方法保护易感人群

62、成年男性, 接种狂犬病疫苗 2 周后出现发热、头疼, 下肢先麻木后瘫痪, 应首先考虑:(D)

- A. 破伤风 B. 狂犬病 C. 类狂犬病性癡病 D. 疫苗接种后反应
E. 脊髓灰质炎

63、地震灾害后出现的特殊危险, 以下自救行为不正确的是:(C)

- A. 当遇到燃气泄漏时, 可用湿毛巾或湿衣服捂住口、鼻
B. 当遇到燃气泄漏时, 不可开灯照明, 防止金属碰撞
C. 当遇到有毒气体泄漏时, 按顺风方向跑到下风地带
D. 当遇到火灾时, 要趴在地下, 用湿毛巾或湿衣服捂住口、鼻, 逆风

匍匐转移到安全地带

E. 当遇到海啸时，不要迷恋财物，带上食物转移至山顶或高地

64、下列哪项不是肾上腺素的作用：(E)

- A. 使心肌收缩力增强 B. 使心率加快 C. 使肾脏和皮肤血管收缩
D. 使骨骼肌血管舒张 E. 使组织液生成减少

65、中毒伴肾功能不全或昏迷者不宜使用下列哪种方法 (B)

- A. 吸氧 B. 硫酸镁导泻 C. 硫酸钠导泻 D. 输液 E. 洗胃

66、高压氧治疗时临床上常用的压力单位是：(C)

- A. 大气压 B. 表压 C. 绝对压 D. 附加压 E. 氧压

67、周围血管征除外：(D)

- A. 水冲脉 B. 点头运动 C. 毛细血管搏动 D. 脉搏短绌 E. 射枪音

68、区别中枢性瘫痪和周围性瘫痪最主要的是：(C)

- A. 肌力的大小 B. 有无感觉障碍 C. 有无病理反射 D. 有无大小便失禁
E. 有无恶心、呕吐

69、高渗缺水早期主要临床表现是口渴，同时还有 (E)

- A. 烦躁 B. 昏迷 C. 幻觉 D. 血压下降 E. 以上都不是

70、肝昏迷早期膳食应：(C)

- A. 禁食豆类 B. 禁食鱼类 C. 低蛋白膳食 D. 低钾 E. 低钠

71、肺梗死最常见的病因是：(C)

- A. 空气 B. 脂肪 C. 血栓 D. 羊水 E. 瘤栓

72、毒蛇咬伤最有效的早期治疗方法是：(C)

- A. 局部注射胰蛋白酶 B. 局部清创 C. 单价抗蛇毒血清 D. 多价

抗蛇毒血清

73、高压氧的绝对禁忌症之一是:(C)

- A. 急性鼻窦炎 B. 活动型肺结核 C. 未经处理的气胸 D. 有颅骨缺损者 E. 妇女月经期与妊娠期

74、糖尿病神经病变以何种神经受累最为常见:(E)

- A. 脊髓前角 B. 自主神经 C. 脊神经根 D. 第III对脑神经 E. 周围神经

75、动静脉瘘可见:(B)

- A. 奇脉 B. 水冲脉 C. 脉搏短绌 D. 交替脉 E. 重脉

76、高压灭菌后物品,超过下列时间后就不能使用:(E)

- A. 3 天 B. 5 天 C. 10 天 D. 7 天 E. 14 天

77、单位发现突发事件,向当地人民政府报告的时限为 (C)

- A. 0.5 小时内 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内
E. 4 小时内

78、下列哪一类水,电解质紊乱早期就易发生循环衰竭:(C)

- A. 高渗性脱水 B. 等渗性脱水 C. 低渗性脱水
D. 水中毒 E. 低钾血症

79、医师在执业活动中不属于应当履行的义务是 (C)

- A. 宣传普及卫生保健知识 B. 尊重患者隐私权
C. 人格尊严、人身安全不受侵犯 D. 努力钻研业务,及时更新知识
E. 爱岗敬业,努力工作

80、严重创伤性休克后,首先应预防的是:(A)

- A. 感染 B. 输血并发症 C. 急性心力衰竭
D. 肠麻痹 E. 急性呼吸窘迫综合征

81、下列关于高血压降压治疗的原则，哪一项是错误的：（ B ）

- A. 发生高血压急症应迅速降压
B. 血压控制满意后，可立即停药
C. 单个药物宜从小剂量开始
D. 联合用药
E. 尽可能用长效制剂，减少血压波动

82、术中判断心跳停止最可能的依据是：（ A ）

- A. 大动脉搏动消失 B. 立即观察瞳孔变化 C. 数呼吸频率
D. 用听诊器听心音 E. 测血压

83、溃疡性结肠炎最多见的类型是（ B ）

- A. 初发型 B. 慢性复发型 C. 慢性持续型
D. 急性暴发型 E. 临床终末型

84、对于涂改伪造病历材料的医务人员应作出的处理是（ B ）

- A. 责令改正 B. 行政处分 C. 依法追究刑事责任
D. 治安管理处罚 E. 给与警告

85、休克早期的表现应除外：（ D ）

- A. 皮肤苍白 B. 呼吸加快 C. 烦躁不安 D. 脉压<20mmHg
E. 恶心、呕吐

86、自动电除颤（AED）的操作方法正确的是（ D ）

- A. 接通电源——安放电极——分析心律——充电——电击除颤

- B. 安放电极——接通电源——分析心律——电击除颤
- C. 安放电极——接通电源——分析心律——充电——电击除颤
- D. 接通电源——安放电极——分析心律——电击除颤
- E. 安放电极——分析心律——接通电源——电击除颤

87、急性心肌梗死左心功能不全伴频发多源性室性早搏，用利多卡因无效，应优选下列哪种药物治疗？（ C ）

- A. 普鲁卡因酰胺 B 普罗帕酮 C 胺碘酮
- D 氨酰心安 E 维拉帕米

88、医师在执业活动中，违反《执业医师法》规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动；情节严重的，吊销其医师执业证书（ B ）

- A. 未经批准开办医疗机构行医的
- B. 未经患者或家属同意，对患者进行实验性临床医疗的
- C. 在医疗、预防、保健工作中造成事故的
- D. 不参加培训和继续教育的
- E. 干扰医疗机构正常工作的

89、急性苯中毒的主要损害是（ B ）

- A. 神经系统 B. 造血系统 C. 消化系统
- D. 循环系统 E 呼吸系统

90、有机磷农药生产或使用过程中，导致人体中毒的主要途径是（ B ）

- A. 消化道 B. 皮肤 C. 粘膜 D. 呼吸道 E. 消化道和粘膜

91、下列关于高血压所致靶器官并发症的叙述，错误的是：（ A ）

- A. 血压急剧升高可形成脑部小动脉的微动脉瘤
- B. 高血压脑病的临床表现在血压降低后可逆转
- C. 高血压是促使冠状动脉粥样硬化的病因之一
- D. 长期持久性高血压可致进行性肾硬化
- E. 严重高血压可并发主动脉夹层

92、毒蛇咬伤后易致失血性休克的最常见毒蛇是:(C)

- A. 金环蛇 B. 蝮蛇 C. 五步蛇 D. 眼镜蛇 E. 海蛇

93、体温每升高 1℃, 脑代谢率增加多少 (E)

- A. 1% B. 2% C. 4% D. 6% E. 8%

94、下列关于心房颤动发病原因的叙述, 错误的是:(D)

- A. 心房颤动的自然发生率随年龄增长而增加
- B. 阵发性心房颤动可见于正常人
- C. 急性酒精中毒时可出现心房颤动
- D. 孤立性心房颤动是指短暂发作的、临床症状不明显的心房颤动
- E. 甲状腺功能亢进症是最常见的出现心房颤动的非心脏性疾病

95、以下不是突发事件现场的警示标识的是:(E)

- A. 禁止标识
- B. 警告标识
- C. 指令标识
- D. 提示标识
- E. 行政标识

96、重度哮喘患者, 痰黏稠咳不出, 应首选哪种祛痰方法:(D)

- A. 抽吸痰液 B. 用抗生素 C. 用氯化铵
D. 输液纠正失水 E. 纠正酸中毒

97、急性有机磷杀虫药中毒患者在症状缓解后，24—96 小时突然发生死亡，最可能（ A ）

- A. 中间综合症 B. 阿托品中毒 C. 严重心律失常
D. 反跳 E. 急性肾衰竭

98、应激性溃疡的发病基础不包括：（ B ）

- A. 重度烧伤 B. 慢性胃炎 C. 颅内血肿
D. 重度创伤 E. 脓毒血症

99、下列哪项不属于糖尿病的慢性并发症：（ D ）

- A. 动脉粥样硬化 B. 肾脏病变 C. 视网膜病
D. 角膜溃疡 E. 心肌病

100、破伤风病人发生阵发性肌肉强烈痉挛，最先出现的是：（ B ）

- A. 面部表情肌 B. 咀嚼肌 C. 颈部肌群
D. 背部肌群 E. 四肢肌

101、下列哪项是临床上确定患者存在急性心肌损害最有价值的指标（ B ）

- A、乳酸脱氢酶增高 B、肌钙蛋白 T 增高 C、血清肌红蛋白增高
D、磷酸肌酸激酶增高 E、心电图出现 ST 段水平下移

102、变异性心绞痛患者首选药物是（ D ）

- A. 胺碘酮 B. ACEI C. 利多卡因 D. 硝苯地平 E. 普萘洛尔

103、形成肾病性水肿最主要的因素是：（ C ）

- A. 毛细血管壁通透性增加 B. 肾小球滤过率下降
C. 低蛋白血症 D. 继发性醛固酮增多 E. 静脉压增高

104、纵膈偏向健侧的疾病不包括（ D ）

- A. 血胸 B. 开放性气胸 C. 张力性气胸 D. 慢性脓胸 E. 急性脓胸

105、患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者对死因有异议的，应当在患者死亡后法定时限内进行尸检。其法定时限是（ D ）

- A. 12 小时内 B. 24 小时内 C. 36 小时内
D. 48 小时内 E. 72 小时内

下列那一项不符合院前急救的特点（ D ）

- A. 社会性及随机性强 B. 急救环境差 C. 紧急性和流动性大
D. 先明确诊断后再开始治疗 E. 病种多样且复杂

107、梗阻性肥厚性心肌病患者一般不宜应用：（ E ）

- A. 异搏定 B. 硫氮卓酮 C. 心得安 D. 地西洋 E. 地高辛

108、急性腹痛伴休克最常见的病因是：（ C ）

- A. 急性心肌梗死 B. 大叶性肺炎 C. 急性坏死性胰腺炎
D. 胃十二指肠溃疡急性穿孔 E. 急性坏死性胆囊炎

109、下列哪项不是糖皮质激素使用的绝对禁忌症：（ D ）

- A. 青光眼 B. 重度高血压 C. 怀孕
D. 活动性肺结核 E. 骨质疏松

110、流行性出血热早期休克的主要原因是：（ B ）

- A. 弥散性血管内凝血 B. 血管壁通透性增加，血浆外渗
C. 肾功能损害 D. 心肌炎 E. 肠道出血，继发感染

111、周期性麻痹的补钾盐方式应首选：（ A ）

- A. 口服氯化钾 B. 静滴葡萄糖加氯化钾 C. 静滴氯化钠加氯化钾
D. 静滴氯化钾 E. 静滴林格氏液

112、开放性气胸的现场急救为：（ D ）

- A. 立即给氧、输液 B. 胸膜腔穿刺抽气 C. 清创术 D. 立即用清洁物品封闭伤口
E. 镇静，注射止痛药

113、多根多处肋骨骨折，因反常呼吸导致呼吸困难时，主要措施是：（ E ）

- A. 肋间神经阻滞 B. 骨折处局部封闭 C. 胸膜腔闭式引流
D. 使用呼吸兴奋剂 E. 固定胸壁

114、心搏骤停时最迅速有效的处理是：（ E ）

- A. 口对口人工呼吸 B. 纯氧人工呼吸 C. 胸外心脏按压
D. 胸内心脏按压 E. 胸外心脏按压同时行口对口人工呼吸

115、抗组胺药的作用是：（ D ）

- A. 减少组胺的释放 B. 破坏组胺 C. 拮抗组胺
D. 与组胺竞争某些受体 E. 抑制肥大细胞生成

116、代谢性酸中毒常见于：（ E ）

- A. 长期静脉滴注葡萄糖 B. 幽门梗阻 C. 急性阑尾炎
D. 食管梗阻 E. 弥漫性腹膜炎

117、苦杏仁中毒后，最有效的解毒药是（ E ）

- A. 阿托品 B. 纳洛酮 C. 二巯丙磺钠
D. 亚甲蓝（美蓝） E. 亚硝酸异戊脂+3%亚硝酸钠+25%硫代硫酸钠

118、所谓有效循环血量是指:(C)

- A. 全身总血量
- B. 在动脉内的血量
- C. 单位时间内通过心血管系统进行循环的血量
- D. 在微循环内的总血量
- E. 在静脉内的血量

119、代谢性酸中毒最突出的症状是:(A)

- A. 呼吸深快, 呼气时带酮味
- B. 唇干舌燥, 眼窝凹陷
- C. 呼吸慢而浅, 呼气时有烂苹果气味
- D. 心率加速, 血压降低
- E. 疲乏, 眩晕

120、判断腹腔内空腔脏器损伤最有价值的是:(D)

- A. 腹膜刺激征
- B. 脉率增快
- C. 呕血
- D. 气腹
- E. 腹胀

121、下列哪项不是新生儿窒息的常见原因 : (C)

- A. 胎儿宫内窘迫
- B. 颅内出血
- C. 胎儿宫内肺炎
- D. 吸入羊水
- E. 分娩前使用过多镇静药

122、损伤的现场急救不包括 (C)

- A. 心肺复苏
- B. 控制外出血
- C. 内脏复位
- D. 骨折固定
- E. 解救窒息

123、食管腐蚀伤后最常发生食管狭窄的部位是:(D)

- A. 食管入口
- B. 左支气管压迹处
- C. 主动脉弓压迹处
- D. 食管下段横膈以下
- E. 贲门处

124、气管异物的临床表现应除外:(E)

- A. 咳嗽、憋气、窒息
- B. 声门下拍击声
- C. 症状暂时缓解

D. 哮喘音

E. 双肺呼吸音不一致

125、对于一氧化碳中毒的患者，如有频繁抽搐，应首选（ A ）

A. 地西洋 10~20mg 静滴

B. 静滴苯妥英钠 5~10g

C. 静脉滴注 20%甘露醇

D. 静脉滴注糖皮质激素

E. 注射呋塞米

126、食管异物最危险的并发症是:(E)

A. 颈部皮下气肿

B. 食管周围炎

C. 食管周围肿胀

D. 纵膈气肿

E. 刺破大血管

127、当脑膜刺激征阳性，无局灶性脑定位体征时，若突然起病，最可能的诊断是：(C)

A. 脑膜炎

B. 病毒性脑炎

C. 蛛网膜下腔出血

D. 脑梗死

E. 脑脓肿

128、头皮裂伤清创的最佳时限最迟应在:(C)

A. 8 小时内

B. 12 小时内

C. 24 小时内

D. 48 小时内

E. 72 小时内

129、区别真性延髓麻痹和假性延髓麻痹最可靠体征是: (E)

A. 是否双侧受累

B. 舌能否伸出

C. 有无声嘶

D. 有无吞咽困

E. 有无舌肌萎缩

130、跨阈步态一般见于:(E)

A. 小脑病变

B. 不完全性截癱

C. 肌营养不良

D. 脑血管意外后遗症 E. 腓神经麻痹

131、学校发生流脑疫情时，哪项防治措施不正确：(D)

A. 易感者接种流脑疫苗 B. 及时将患者隔离

C. 密切接触者进行预防服药

D. 预防服药后可以进行集体活动或大型集会 E. 以上都不对

133、80 岁女性，既往体健，晨练后突起左下腹剧痛 1 天，无呕吐，
肛门停止排便排气。体格检查：明显腹胀，以左下腹为主，肠鸣音亢
进，直肠指检阴性。该患者初步诊断为：(A)

A. 乙状结肠扭转 B. 肠套叠 C. 结肠肿瘤

D. 小肠扭转 E. 肠系膜血栓

134、过敏性休克的首选治疗药物为：(B)

A. 糖皮质激素 B. 0.1% 肾上腺素 C. 抗组胺药

D. 钙剂 E. 硫代硫酸钠注射剂

135、胃十二指肠溃疡大出血宜行：(A)

A. 胃大部切除术 B. 三腔二囊管压迫止血 C. 贲门周围血管离断
术+脾切除 D. 肝叶切除术 E. 肝总动脉结扎术

136、从高空坠落，左枕着地，伤后进行性意识障碍，右侧瞳孔逐渐
散大，诊断上首先考虑为：(C)

A. 右侧顶枕部急性硬膜下血肿 B. 左侧顶枕部急性硬膜下血肿

C. 右侧额颞部挫伤伴急性硬膜下血肿 D. 左侧额颞部挫伤伴急性
硬膜下血肿 E. 右侧颅后窝小脑血肿

137、关于高危妊娠的描述，错误的是：(B)

A. 以往有异常妊娠史或不良分娩史 B. 年龄为 16—35 岁 C. 孕妇有严重合并症，如心脏病、糖尿病 D. 各种妊娠并发症、胎位异常及骨盆狭窄 E. 早孕期间用过对胎儿有影响的药物或接触放射线

138、下述哪项是卵巢肿瘤常见的并发症：(A)

A. 蒂扭转 B. 破裂 C. 感染 D. 恶变 E. 腹膜炎

139、男，7 岁，2 周前曾发热、嗓子痛。近 3 天眼睑水肿，尿量减少，尿色如浓茶。今晨头痛、呕吐，半小时前突然抽搐，急诊来院。最可能的诊断是：(C)

A. 脑膜炎 B. 脑出血 C. 高血压脑病 D. 尿毒症 E. 低钠血症

140、男患儿，3 岁，上腹部汽车撞伤 2 小时入院，腹腔诊断性穿刺（-）。诊断为腹壁挫伤。伤后 8 小时腹部逐渐饱胀，腹部触诊时哭闹，腹肌紧张，肠鸣音消失，应考虑：(A)

A. 胃破裂，弥漫性腹膜炎 B. 腹壁挫伤 C. 肝破裂 D. 脾破裂 E. 胰腺损伤

141、卫生法律法规是指 (E)

A. 反映统治阶级意志，由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的行为规范的总和

B. 由国家制定或认可，旨在调整保护人体健康活动中形成的各种社会关系的法律规范的总和

C. 执政阶级为维护人体健康，通过国家制定或认可的行为规则的总称

D. 统治阶级为维护人体健康，通过国家制定或认可的行为规则的总称

E. 执政阶级为维护人体健康，通过国家制定或认可，并用国家强制力

保证实施的行为规则的总称

142、医疗事故是指（ E ）

- A. 虽有诊疗护理错误，但未造成病员死亡、残废、功能障碍的
- B. 由于病情或病员体质特殊而发生难以预料和防范的不良后果的
- C. 发生难以避免的并发症的
- D. 以病员及其家属不配合诊治为主要原因而造成不良后果的
- E. 在诊疗护理工作中，因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍的

143、COPD 患者突然出现胸痛、气急、呼吸困难、大汗不安，首先应考虑（ A ）

- A. 自发性气胸
- B. 支气管哮喘急性发作
- C. 左心衰竭
- D. 肺炎
- E. 胸膜炎

144、流行性腮腺炎的传播方式除外：（ B ）

- A. 说话
- B. 蚊虫叮咬
- C. 咳嗽
- D. 喷嚏
- E. 以上都不对

145、可同时加重心源性哮喘和支气管哮喘的药物是：（ D ）

- A. 新斯的明
- B. 酚妥拉明
- C. 吗啡
- D. 普萘洛尔
- E. 维拉帕米

146、Colles 骨折远端的典型移位是：（ B ）

- A. 向尺侧及背侧移位
- B. 向桡侧及背侧移位
- C. 向尺侧及掌侧移位
- D. 向桡侧及掌侧移位
- E. 向背侧成角移位

147、咯血的特征正确的是（ B ）

- A. 鲜红色血痰多见于肺炎克雷伯杆菌肺炎
- B. 肺癌常表现为大咯血
- C. 二尖瓣狭窄所致咯血多为胶冻样血痰
- D. 左心衰竭常有粉红色泡沫样痰
- E. 支气管扩张常为痰中带血

148、骨盆骨折最危险的并发症是:(A)

- A. 盆腔内出血
- B. 膀胱破裂
- C. 尿道断裂
- D. 骶丛神经损伤
- E. 直肠损伤

149、诊断肠梗阻最主要的依据是:(E)

- A. 间歇性腹痛
- B. 腹部隐痛
- C. 恶心、呕吐
- D. 肛门停止排便排气
- E. X 射线见腹部有多个液气平面及胀气肠袢

150、烧伤患者在早期口渴, 最适合饮用下列哪种液体:(C)

- A. 大量冷开水
- B. 大量糖水
- C. 少量多次饮盐水
- D. 大量茶水
- E. 大量橘子水

151、变异性心绞痛的发生机制主要是:(B)

- A. 严重贫血
- B. 冠状动脉痉挛
- C. 冠状动脉管腔严重狭窄
- D. 循环血流量减少, 如休克
- E. 不稳定斑块内出血, 纤维帽破裂、血小板的凝聚于血栓形成

152、硝酸甘油治疗变异型心绞痛的主要机制是:(A)

- A. 舒张冠状血管
- B. 降低心肌耗氧量
- C. 降低心脏前负荷
- D. 降低心脏后负荷
- E. 改善心脏代谢

153、上消化道出血若行急诊胃镜检查应在上消化道出血后:(A)

- A. 1~2 天内进行 B. 2~3 天内进行 C. 3~4 天内进行
D. 4~5 天内进行 E. 即刻进行

154、提示子宫即将破裂的是:(C)

- A. 听不到胎心音 B. 宫底迅速上升 C. 强直性宫缩;
D. 持续大量阴道出血 E. 胎儿先露部于内诊时触不到

155、严重的Ⅱ性呼吸衰竭患者,不给予高浓度氧是因为:(E)

- A. 缺氧不是主要原因 B. 可引起氧中毒 C. 诱发呼吸碱
D. 诱发代碱 E. 解除了低氧兴奋呼吸中枢的作用

156、甲流患者出现下列状况之一为危重病例:(D)

- A. 持续高热大于 3 天 B. 影像学检查有肺炎征象
C. 原有基础疾病明显加重 D. 呼吸衰竭
E. 神智改变:反映迟钝,嗜睡,躁动,紫癜

157、最先提出“不伤害原则”的西方医学家是(A)

- A. 希波克拉底 B. 盖仑 C. 维萨里 D. 白求恩 E. 桑德斯

158、慢性肺源性心脏病发病的主要因素,下列哪项不正确?(B)

- A 肺血管阻力增加 B 气道梗阻 C 肺动脉高压
D 低氧血症及高碳酸血症 E 血粘度增加

159、医护人员进入非典型性肺炎病区必须戴棉纱口罩,每隔多长时间应更换口罩:(B)

- A. 2 小时 B. 4 小时 C. 8 小时 D. 12 小时 E. 24 小时

160、传染性非典型性肺炎以发热为首发症状,体温一般:(D)

A. <37.5℃ B. >37℃ C. >38.5℃ D. >38℃ E. >36.5℃

161、终止心动过速最有效的方法是:(B)

A. 利多卡因 B. 电复律 C. 异丙肾上腺素 D. 人工心脏起搏
E. 体外除颤

162、以下不是淡水溺水者现场特点的是:(B)

A. 早期损害主要是窒息或呼吸困难
B. 顽固的低氧血症
C. 可致急性溶血
D. 心室纤颤
E. 急性肾衰竭

163、提示昏迷程度加重的是:(E)

A. 双侧对称性浅反射减弱 B. 深反射亢进或消失
C. 双侧腱反射不对称
D. 出现病理反射 E. 浅反射由减弱到消失

164、反映早期休克比较敏感的指标是:(B)

A. 血压 B. 脉搏 C. 皮肤温度
D. 意识 E. 尿量

165、急性亚硝酸盐中毒的特效解毒药物是:(A)

A. 美蓝 B. 纳洛酮 C. 氟马西尼
D. 乙酰胺 E. 二巯丙磺酸钠

166、急性肺动脉栓塞的血栓来源主要是:(E)

A. 上肢静脉 B. 肾静脉 C. 右心房

D. 盆腔静脉 E. 下肢深静脉

167、推荐的诊断肺动脉栓塞最敏感的无创检查方法是:(B)

A. 肺动脉造影 B. 放射性核素肺通气灌注扫描 C. MRI
D. 螺旋 CT E. DSA

168、张力性气胸造成呼吸、循环障碍的机理是 (D)

A. 胸壁软化, 反常呼吸 B. 肺组织挫伤, 通气受阻
C. 肺泡间质水肿, 换气受阻 D. 患侧肺萎陷, 纵膈向健侧移位
E. 严重皮下气肿, 肺内气体流失

169、急性肺栓塞溶栓时间窗是:(E)

A. 6 小时内 B. 8 小时内 C. 12 小时内 D. 24 小时内 E. 14
天内

170、治疗脑水肿的首选药是 (A)

A. 甘露醇 B. 螺内酯 C. 呋塞米 D. 氯噻嗪 E. 氢氯噻嗪

171、卫生应急培训重点对象是 (C), 要求学习卫生应急专业知识、专业理论、专业技能和培训技巧, 系统掌握卫生应急法律法规和预案, 熟悉卫生应急领域的最新进展。

A. 医疗救治人员
B. 执法监督人员
C. 卫生应急师资队伍
D. 相关部门卫生应急管理干部
E. 卫生应急救援志愿者

172、突发事件现场需标识红色优先处置的除外: (C)

- A. 受到核辐射剂量大于 10Gy
- B. 溺水者体温低于 28~30 摄氏度
- C. 严重火灾Ⅲ度烧伤面积占体表面积 25% 者
- D. 溺水者出现癫痫或其他精神异常
- E. 爆炸冲击波引起“急性挫伤震荡综合征”

173、急性肺水肿 X 线检查的典型改变是: (E)

- A. Kerley B 线
- B. 右下肺动脉增宽
- C. 肺门舞蹈
- D. 两肺弥散型小片状影
- E. 肺门蝶形密度增高影

174、丹毒的致病菌是: (B)

- A. 梭状芽孢杆菌
- B. β 溶血性链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 白色念珠菌
- E. 表皮葡萄球菌

175、尿毒症性高钾血症最有效的治疗方法是: (D)

- A. 静脉滴注碳酸氢钠
- B. 静脉滴注葡萄糖酸钙
- C. 静脉滴注高渗葡萄糖和胰岛素
- D. 血液透析
- E. 口服钠型阳离子交换树脂

176、上尿路结石出现血尿的特点是: (A)

- A. 活动后血尿
- B. 初始血尿
- C. 终末血尿
- D. 无痛性血尿
- E. 全程血尿

177、徒手心肺复苏时, 心脏按压与人工呼吸的频率比例宜为: (E)

- A. 5: 1
- B. 5: 2
- C. 10: 1
- D. 15: 1
- E. 30: 2

178、较大面积组织渗血的止血是: (E)

- A. 指压法
- B. 加压包扎法
- C. 屈曲肢体加垫止血法
- D. 止血带止血法
- E. 填塞止血法

179、室性心动过速与室上性心动过速的鉴别，下列哪项最有意义：(D)

A. 心室率>160 次/ min B. 心电图 QRS 宽大畸形 C. 既往发现室性期前收缩 D. 心电图示心室夺获及室性融合波 E. 心脏增大

180、临床死亡的概念应除外：(B)

A. 呼吸停止 B. 瞳孔缩小 C. 脑电图停止 D. 面色发绀
E. 脉搏消失

181、下列哪种药物较适用于癫痫持续状态：(E)

A. 巴比妥 B. 阿米妥 C. 苯妥英钠 D. 三聚乙醛 E. 安定

182、临床上最常见的心肌梗死类型是：(B)

A. 急性前壁心肌梗死 B. 急性下壁心肌梗死 C. 急性心尖心肌梗死
D. 急性前间壁心肌梗死 E. 急性心内膜下心肌梗死

183、急性胰腺炎发作时，下列哪项结果不可能增高：(D)

A. WBC B. LDH C. 血糖 D. 血钙 E. 血清淀粉酶

184、解除舌根后坠堵塞呼吸道的简便方法是：(B)

A. 环甲膜穿刺术 B. 口咽管放置术 C. 经鼻腔气管插管术 D. 经口腔气管插管术 E. 气管切开术

185、暴雨过后出现滑坡、泥石流等灾害时，以下自救互救行为正确的是：(A)

A. 在野外遇到泥石流时，要向垂直于泥石流前进的方向跑
B. 山区、半山区的村庄居民，不要外出，尽快回家，隐蔽在室内或地下，或野外的低洼处

- C. 遇到泥石流时顺着滚石方向往山下跑
- D. 在山区扎营，选在谷底排洪的通道，以及河道弯曲、汇合处
- E. 发现有人被捆在泥石流当中，又无法直接拉出来，应该垂直挖掘

186、急性呼吸窘迫综合症的治疗，下述哪项是错误的：(B)

- A. 应针对病因积极治疗 B. 应尽量提高吸氧浓度，以纠正呼吸窘迫
- C. 严格控制补液量 D. 尽量予晶体液以维持血容量基本正常
- E. 类固醇激素应早期大量使用

187、下面哪一种说法是错误的？(C)

- A. 海水淹溺威胁生命的主要原因是寒冷、饥饿、缺水和海水浸渍
- B. 毒蛇咬伤早期救治关键是阻断毒素扩散
- C. 电击伤救治的第一步是心肺复苏
- D. 海难伤员复温非常重要
- E. 气道有异物是必须先清理异物

188、一氧化碳中毒患者发生昏迷应尽早给予：(A)

- A. 高压氧治疗 B. 高流量氧治疗 C. 鼻导管吸氧 D. 脱水降颅内压
- E. 盐皮质激素

189、心尖区收缩中期附加音并有收缩中晚期杂音，最可能的诊断为：

(C)

- A. 冠心病劳力型心绞痛 B. 风心病二尖瓣关闭不全 C. 二尖瓣脱垂
- D. 扩张型心肌病 E. 乳头肌功能不全

190、入病房前加带一次性口罩、帽子、防护目镜，加穿鞋套及隔离衣；继续诊疗护理临床诊断患者换外层手套；诊疗护理疑似患者换外

层隔离衣、外层鞋套及外层手套应在:(C)

A 相对清洁区 B. 半污染区 C. 污染区 D. 清洁区 E. 非隔离区

191、有关喹诺酮类性质和用途的叙述, 错误的是:(D)

A. 萘啶酸为本类药物的第一代, 仅用于尿路感染, 其作用弱 B. 吡哌酸对尿路感染有效外, 用于肠道感染及中耳炎 C. 第三代该类药物的分子中均含氟原子

D. 本类药物可以代替青霉素 G 用于上呼吸道感染 E. 环丙沙星属于第三代喹诺酮类抗菌药物

192、儿童及青少年患者长期应用抗癫痫药苯妥英钠易发生的副作用是:(B)

A. 嗜睡 B. 齿龈增生 C. 心动过速 D. 过敏 E. 记忆力减退

193、弥散性血管内凝血(DIC)指的是:(E)

A. 心、肝、肾等重要器官中有较多的血栓形成 B. 全身小动脉内有广泛性的血栓形成 C. 全身小静脉内有广泛的血栓形成 D. 小动脉和小静脉内均有广泛性的血栓形成 E. 微循环内有广泛的微血栓形成

194、慢性支气管炎痰液呈:(D)

A. 铁锈色痰 B. 粉红色泡沫痰 C. 大量脓痰 D. 白色黏液泡沫状痰 E. 红棕色黏稠痰

195、癫痫病灶部位在 γ CBF 显像的阳性表现为:(D)

A. 发作期和发作间期均见局部放射性增高 B. 发作期和发作间期均见局部放射性减低 C. 发作期局部放射性减低, 发作间期局部放射性增高 D. 发作期局部放射性增高, 发作间期放射性减低

E. 发作期和发作间期均无放射性改变

196、判定心肌是否存活最可靠的无创性心脏检查方法是:(B)

A. 超声心电图 B. PET 心肌显像 C. X 线 CT D. 数字减影血管造影 (DSA) E. 冠状动脉造影

197、高压氧舱内输液有发生气栓症的危险, 主要发生在:(B)

加压过程中 B. 减压过程中 C. 高压氧治疗整个过程中均可发生
D. 0.3MPa 以上的高压氧治疗中 E. 0.2MPa 以下的高压氧治疗中

198、上肢出血应用止血带时不应缚在:(C)

A. 上臂上 1/3 B. 上臂中上 1/3 C. 上臂中 1/3 D. 上臂中下 1/3 E. 上臂下 1/3

199、下列烧伤急救原则中正确的是:(E)

A. 凡有呼吸道烧伤, 一律作气管切开 B. 凡有烧伤者一律用哌替啶止痛
C. 热液烫伤者不能用较干净冷水浸泡 D. 应就地给与清创
E. 立即消除烧伤原因

200、下列哪种疾病可见心包摩擦音:(C)

A. 右心衰竭 B. 严重贫血 C. 急性心肌梗死 D. 甲状腺功能亢进
E. 主动脉瓣关闭不全

201、肾病综合征合并脑血栓者, 治疗中作用肯定的药物是:(C)

A. 阿司匹林 B. 双嘧达莫 C. 低分子肝素 D. 低分子右旋糖酐
E. 氯吡格雷

202、高血压病脑出血时, 最常见的出血部位是:(D)

A. 小脑齿状核 B. 小脑皮质 C. 桥脑 D. 基底节 E. 延脑

203、急性吗啡类中毒的特效解毒药是:(C)

- A. 安易醒 B. 解氟灵 C. 纳洛酮 D. 硫代硫酸钠
E. 亚硝酸异戊脂

204、腹部闭合性损伤合并出血性休克的处理原则 (E)

- A. 立即手术探查 B. 输血并给止血药 C. 输血并给抗生素
D. 积极抗休克, 休克纠正后手术探查
E. 积极抗休克的同时手术探查

205、急性心肌梗死早期(24 小时内)的死亡原因主要是:(B)

- A. 心源性休克 B. 心律失常 C. 心力衰竭
D. 心脏破裂 E. 心肌梗死后心绞痛

206、单侧多根多处肋骨骨折最严重的生理改变是 (B)

- A. 疼痛, 呼吸运动减弱 B. 胸壁软化, 反常呼吸
C. 咳嗽, 血痰 D. 血气胸 E. 呼吸衰竭

207、防流感的棉纱口罩, 棉纱层数必须达到 (B) 层。

- A、8 层 B、12 层 C、16 层 D、24 层 E、32 层

208、急性有机磷杀虫药中毒治疗过程中出现反跳的原因除外 (C)

- A、污染的皮肤未彻底清洗干净 B、洗胃不彻底
C、胆碱酯酶复活剂用量不足 D、阿托品停药过早
E、阿托品用量不足

209、与突发公共卫生事件现场分区温区相对应的颜色警示为 (B)

- A. 红色 B. 黄色 C. 绿色 D. 白色 E. 蓝色

210、对流动人口中的传染性非典型肺炎病人、疑似病人处理的原则

是（ D ）

- A. 就地控制、就地治疗、就地康复
- B. 就地隔离、就地治疗、就地康复
- C. 就地控制、就地观察、就地治疗
- D. 就地隔离、就地观察、就地治疗
- E. 就地观察、就地治疗、就地康复

211、下列均是肾前性肾功能不全的诱因，除外（B）

- A. 失血 B. 恶性高血压 C. 过度利尿
- D. 严重腹泻 E. 心包填塞

212、高血压脑病的特征，哪项是错误的：(E)

- A. 可发生于嗜铬细胞瘤 B. 可发生于急进性高血压 C. 以颅内压增高为主要表现
- D. 发作时先有血压突然升高 E. 大多数伴有急性水肿表现

213、对风疹的密切接触者医学观察为几天：(C)

- A. 14 B. 5 C. 21 D. 12 E. 15

214、关于胎膜早破的处理不正确的是：(D)

- A. 等待疗法适用于 28~35 周不伴感染，羊水池深度 $\geq 3\text{CM}$ B. 破膜 12 小时以上者，应预防性使用抗生素
- C. 孕期 35 达周以上分娩发动，可令其自然分娩 D. 胎膜早破均应选择剖宫产终止妊娠
- E. 避免不必要的肛诊及阴道检查

215、如患者误服强碱性溶液后，不能用来口服治疗的是：(E)

- A. 牛奶 B. 蛋清 C. 冷生理盐水 D. 弱酸性溶液 E. 弱碱性溶液

216、有关酮体的叙述，正确的是：(C)

- A. 酮体是肝内脂肪酸分解的异常中间产物 B. 所有组织都可合成，但以肝中合成为主 C. 在肝中合成；但在肝外组织氧化利用 D. 产生过多的原因是肝功能障碍 E. 产生过多的原因是糖类摄入过多

217. 急性心包炎心包积液最突出的临床表现是：(C)

- A. 心前区疼痛 B. 发热 C. 呼吸困难 D. 声嘶 E. 吞咽困难

218、高渗性缺水与低渗性缺水的临床表现的主要鉴别点是：(B)

- A. 手足麻木 B. 口渴明显 C. 视力模糊 D. 恶心、呕吐
E. 脉压减小

219、诊断有机磷中毒最重要的指标为：(B)

- A. 确切的接触史 B. 毒蕈碱样和烟碱样症状 C. 意识障碍 D. 随呼吸可闻及蒜味 E. 双眼颞侧盲

220、对诊断消化性溃疡穿孔最有价值的临床表现是：(E)

- A. 突发上腹部剧痛 B. 腹式呼吸消失 C. 上腹部压痛明显 D. 上腹部有反跳痛 E. 肝浊音界消失

221、引流胸腔液体，放引流的部位：(C)

- A. 锁骨中线 2 肋间 B. 腋中线 4~5 肋间 C. 腋中线与腋后线之间 6~8 肋间 D. 肩胛线 6~8 肋间 E. 肋膈角处

222、小脑幕切迹疝时，疝入小脑幕裂孔的组织是：(B)

- A. 额叶内侧 B. 颞叶沟回 C. 顶下小叶 D. 枕叶 E. 小脑扁桃体

223、结核菌素试验的注射部位为：(A)

- A. 左前臂掌侧面中、下 1 / 3 交界处皮内

B. 左前臂掌侧面中、下 1 / 3 交界处皮下

C. 左前臂中、下 1 / 3 交界处

D. 右前臂掌侧面中、下 1 / 3 交界处皮内

E. 右前臂掌侧面中、下 1 / 3 交界处皮下

224、匀称体形正常人肝叩诊相对浊音界，哪项是错误的：（ C ）

A. 右锁骨中线第 5 肋间 B. 右锁骨中线上下径为 9~11cm

C. 右腋中线第 8 肋间 D. 右肩胛线第 10 肋骨水平

E. 肝绝对浊音界比相对浊音界低 1~2 肋间

225、血压下降在休克中的意义为：（ B ）

A. 是诊断休克的唯一依据 B. 是休克最常见的临床表现 C. 是估计休克程度的主要指标 D. 是组织细胞缺氧的主要指标

E. 是休克最早的指标

226、女性，20 岁。夜间排尿后突然感右下腹剧痛，随后恶心呕吐。

平时月经规律，末次月经为 10 天前。妇科检查子宫右侧可触及手拳大小囊实性包块，触痛，推移后疼痛加剧，首先考虑：（ D ）

A. 输卵管妊娠破裂 B. 急性阑尾炎 C. 急性附件炎

D. 卵巢囊肿蒂扭转 E. 卵巢黄体破裂

227、左侧位心脏照片上心后缘与食管前间隙消失提示：（ C ）

A. 右心房增大 B. 左心房增大 C. 左心室增大 D. 右心室增大

E. 肺动脉主干扩张

228、关于治疗休克的叙述，错误的是：（ D ）

A. 失血性休克的治疗是扩容

- B. 感染性休克时可应用大剂量氢化可的松
- C 失血性休克时，止血是不可忽视的主要手段
- D. 感染性休克时，应首先选用升压药
- E. 感染性休克应恢复有效循环血量

229、初期复苏的任务和步骤可归纳为：（ B ）

- A. 供氧>进行人工呼吸>建立人工循环
- B. 保持呼吸道畅通>进行人工呼吸>建立人工循环
- C. 心脏复苏>兴奋呼吸中枢>脑复苏
- D. 兴奋呼吸中枢>心脏复苏>脑复苏
- E. 头部降温>脱水>皮质激素治疗

230、医疗机构内的（ C ）人员等，根据其在医疗机构内从事的工作性质和职业类别，参照相应人员分类执行《医疗机构从业人员行为规范》

- A. 实习人员 B. 进修人员 C. 实习人员、进修人员、签订劳动合同但尚未进行执业注册的人员和外包服务 D. 签订劳动合同但尚未进行执业注册的人员 E. 外包服务

231、肝性脑病口服乳果糖的主要作用是：（ A ）

- A. 减少肠道内氨的形成和吸收 B. 纠正氨基酸不平衡 C. 降低门静脉压力 D. 纠正电解质紊乱 E. 纠正酸碱平衡紊乱

232、二尖瓣关闭不全：（ D ）

- A. 第一心音增强 B. 心率小于脉率 C. 心室律绝对不规整
- D. 心尖部 3 / 6 级收缩期杂音 E. 开瓣音

233、女性，20岁。反复发作喘息、呼吸困难、咳嗽2年。体检：双肺散在哮鸣音，心脏无异常。有助于明确诊断的检查结果是：（D）

- A. 最大呼气流量显著降低
- B. 一秒钟用力呼气容积下降
- C. 最大呼气中段流量下降
- D. 支气管舒张试验阳性
- E. x线胸片显示肺纹理稍多

234、健康危险因素评价对下面哪项疾病的预防可以说是一种相对有效的措施（A）

- A. 高血压
- B. 痢疾
- C. 脊髓灰质炎
- D. 麻疹
- E. 流行性感

235、肺结核主要通过：（C）

- A. 握手接触传染
- B. 输血传染
- C. 传染性病人咳嗽、咳痰、打喷嚏或大声说话时的飞沫传染
- D. 传播途径不明
- K. 以上都不对

236、女性，7岁。持续发热1周，体温可达 $39.6^{\circ}\text{C}\sim 40.2^{\circ}\text{C}$ ，每天最低温度为 37.8°C 左右。此热型属于：（D）

- A. 波浪热
- B. 间歇热
- C. 稽留热
- D. 弛张热
- E. 不规则热

237、提示左心功能不全的脉搏是：（C）

- A. 奇脉
- B. 迟脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 重搏脉

238、吸人性肺脓肿最常见的病原菌是：（E）

- A. 肺炎克雷伯杆菌
- B. 肺炎球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 葡萄球菌
- E. 厌氧菌

239、下列问诊内容正确的是：（D）

- A. 你心前区痛反射到左肩吗
- B. 你右上腹痛反射到右肩痛吗

C. 解大便有里急后重 D. 你觉得最主要的是哪里不适

E. 腰痛时反射到两大腿内侧痛吗

240、肺部比较叩诊不正确的是：（ E ）

A. 叩诊顺序，由上至下，由前至后，左右对称比较叩诊

B. 叩诊时应注意音响变化

C. 叩前胸与侧壁时扳指与肋间平行

D. 叩肩胛间区扳指与脊柱平行

E. 叩肩胛下区时扳指可任意放置

241、一侧瞳孔直接对光反应消失，间接对光反应存在，病变在：（ C ）

A. 同侧动眼神经 B. 对侧动眼神经 C. 同侧视神经

D. 对侧视神经 E. 视交叉

242、病理反射的出现是由于：（ D ）

A. 脊髓反射弧的损害 B. 神经系统兴奋性增高 C. 脑干网状
结构损害 D. 锥体束受损 E. 基底节受损

243、左心衰时呼吸困难的特点，不包括：（ D ）

A. 活动时加重 B. 休息时减轻 C 仰卧时加重

D. 常伴淤血性肝大 E. 常采取端坐呼吸体位

244、某休克患者，心率快，测中心静脉压为 $5\text{cmH}_2\text{O}$ (0.49kPa)，应采取：（ A ）

A. 迅速补充液体 B. 控制小量输液 C. 心功能不全，立即给强心
利尿药 D. 控制输液量，加用强心药 E. 休克与血容量无关

245、戊型病毒性肝炎是：（ B ）

- A. 经空气、飞沫、尘埃传播 B. 经水、食物、苍蝇传播
C. 经手、用具、玩具传播 D. 经血液、体液、血制品传播
E. 经吸血节肢动物传播

246、治疗短暂性脑缺血发作的药物是：（ E ）

- A. 烟酸 B. EACA C. 卡马西平 D. 苯妥英钠 E 小剂量阿司匹林

247、消化性溃疡最常见的并发症是：（ C ）

- A. 反流性食管炎 B 胃肠穿孔 C. 上消化道出血 D. 癌变 E. 幽门梗阻

248、可行胃镜的是：（ E ）

- A. 疑有胰胆病变 B. 疑有十二指肠水平部憩室 C. 下消化道出血原因不明
D. 疑肠壁内病变 E. 疑有食管源性胸痛

249、肺动脉瓣区在：（ A ）

- A. 胸骨左缘第 2 肋间处 B. 心尖区 C. 胸骨右缘第 2 肋间处
D. 胸骨左缘第 3~4 肋间处 E. 胸骨体下端近剑突偏右或稍偏左处

250、肝脓肿 B 超可见：（ D ）

- A. 牛眼样病灶 B. 周边低回声晕环 C. 壁薄无回声暗区
D. 壁厚毛糙的无回声暗区 E. 后方伴声影

251、急性腹膜炎合并麻痹性肠梗阻所致的缺水为：（ C ）

- A. 高渗性缺水 B. 低渗性缺水 C. 等渗性缺水 D. 原发性缺水
E. 继发性缺水

252、胰腺疾病与胆道疾病相关的解剖学基础是：（ D ）

- A. 均受肝内胆汁分泌的影响

B. 胰腺炎胰腺肿大时可压迫胆总管

C. 胆道与胰腺为相邻器官

D. 胆总管与胰管有共同通道及出口

E. 胆总管结石压迫胰管

253、急性虹膜睫状体炎时，局部治疗首先应该点用：（ C ）

A. 抗生素 B. 抗病毒药 C. 麻痹扩瞳剂 D. 抗生素加抗病毒药
E. 抗真菌药

254、周围性眩晕一般不伴有：（ D ）

A. 听力下降 B. 耳鸣 C. 水平眼震 D. 意识丧失
E. 面色苍白、出汗、恶心、呕吐

255、急性闭角型青光眼的瞳孔开大是由于高眼压使：（ E ）

A. 交感及副交感神经功能失调 B. 瞳孔开大肌兴奋 C. 副交感神经抑制
D. 交感神经兴奋 E. 瞳孔括约肌麻痹

256、如视力突然骤减，只有光感，伴头痛头昏。眼底检查：视网膜血管变细，后极部视网膜呈急性贫血，为乳白色混浊，黄斑，还有一樱桃红斑点。最可能的诊断是（ E ）

A. 视网膜血管炎 B. 视网膜中央静脉阻塞 C. 糖尿病性视网膜病变
D. 高血压性视网膜病变 E. 视网膜中央动脉阻塞

257、化学性眼外伤急救处理原则首选：（ C ）

A. 球结膜下注射止血 B. 扩瞳 C. 冲洗结膜囊 D. 抗感染
E. 理疗

258、急性牙髓炎最有效的治疗方法是：（ B ）

- A. 拔除患牙 B. 开髓引流 C. 相应牙龈处分开引流
D. 去腐蚀 E. 消炎止痛

259、重度颅脑损伤昏迷患者的护理与治疗下列哪项处理不正确：(B)

- A. 维持呼吸道通畅 B. 头低位，对脑水肿的治疗有帮助
C 加强营养 D. 解除尿潴留 E. 应用促苏醒药物或高压氧治疗

260、卫生部发布的《公众预防传染性非典型肺炎指导原则》指出，传染性非典型肺炎最有效的预防措施是：(A)

- A. 生活、工作场所通风
B. 不与传染性非典型肺炎或疑似传染性非典型肺炎患者接触
C. 注意个人卫生
D. 在人群密度高或不通风的场所内戴口罩
E. 服用中西药物

261、诊断十二指肠溃疡的可靠 X 线征象是：(D)

- A. 十二指肠球部变形 B. 十二指肠球部激惹 C. 十二指肠球部压痛
D. 十二指肠球部浓钡影 E. 十二指肠球部狭窄梗阻

262、男，60 岁，主诉粘液血便，大便变细，钡灌肠显示直肠和乙状结肠充盈缺损，管腔不规则变窄，应考虑 (D)

- A. 溃疡性结肠炎 B. 阿米巴结肠炎 C. Crohn 病 D. 结肠癌
E. 肠结核

263、高压氧治疗一氧化碳中毒的主要机制是：(B)

- A. 血液中结合氧量增加 B. 血液中物理溶解氧量增加 C. 血液中血红蛋白增加
D. 氧和血红蛋白的亲合力增加 E. 机体

的摄氧能力增强

264、控制传染病流行的 3 个重要环节除了消灭传染源和保护易感人群，还包括：（ A ）

- A. 切断传播途径 B. 开展流行病学调查 C. 加强体育锻炼
D. 积极做好消杀工作 E. 防止交叉感染

265、某人因进食未煮熟的海产品引起腹泻，最可能与下列哪种细菌有关（ B ）

- A. 肠产毒性大肠埃希菌 B 副溶血性弧菌 C. 沙门氏菌
D. 金黄色葡萄球菌 E. 肠致病性大肠埃希菌

266、能使肾上腺素升压作用翻转的药物是：（ C ）

- A. 普萘洛尔 B. 苯海拉明 C. 酚妥拉明 D. 硝苯地平
E. 硝酸甘油

267、关于流感病毒的致病性，不正确的是：（ B ）

- A. 甲型流感病毒的表面抗原易发生变异
B. 甲型流感病毒的核蛋白易发生变异
C. 流感病毒通过空气飞沫传播
D. 流感病毒一般不引起病毒血症
E. 某些型别的禽流感病毒可传染给人

268、关于上消化道出血哪项不正确：（ E ）

- A. 上消化道大量出血后多数可引起呕血
B. 胃内积血 250ml~300ml 可引起呕血
C. 每日出血 50ml~100ml 可出现黑粪

D. 周围血可见晚幼红细胞与嗜多彩红细胞

E. 急性大出血时血象检查为早期诊断和病情观察的依据

269、循环骤停的临界时间是：（ C ）

A. 1 分钟 B. 2 分钟 C. 4 分钟 D. 8 分钟 E. 10 分钟

270、献血者为 A 型血，经交叉配血试验，主侧不凝集而次侧凝集，

受血者的血型为：（ B ）

A. B 型 B. AB 型 C. A 型 D. O 型 E. A 型或 B 型

271、II 型呼衰的血气诊断标准是：（ C ）

A. $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$

B. $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 60\text{mmHg}$

C. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$

D. $\text{PaO}_2 < 40\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 40\text{mmHg}$

E. $\text{PaO}_2 < 70\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 55\text{mmHg}$

272、导致肺水肿最直接的原因是：（ C ）

A. 肺动脉高压 B. 右心室压增高 C. 肺静脉压升高

D. 左心室舒张末压增高 E. 右心房压增高

273、对于干啰音的描述，不正确的是：（ E ）

A. 音调较高 B. 持续时间较长 C. 吸气时也能听到

D. 呼气时更为明显 E. 部位较固定

274、急性糜烂出血性胃炎的常见病因不包括：（ D ）

A. 非甾体类抗炎药 B. 脑外伤 C. 乙醇 D. 幽门螺杆菌感染

E. 严重烧伤

275、急性下壁心梗患者血清 CK-MB 浓度的典型变化为发病后：（ C ）

A. 6~12 小时达到高峰 B. 13~15 小时达到高峰 C. 16~24 小时达到高峰 D. 25~35 小时达到高峰 E. 36~48 小时达到高峰

276、较常出现杵状指(趾)的呼吸系统疾病是（ D ）

A. 慢性支气管炎 B. 阻塞性肺气肿 C. 支气管哮喘 D. 支气管扩张症 E. 支原体肺炎

277、急性颅内压增高时病人早期生命体征改变为：（ E ）

- A. 血压升高，脉搏变缓，脉压变小
- B. 血压升高，脉搏增快，脉压增大
- C. 血压降低，脉搏变缓，脉压变小
- D. 血压降低，脉搏增快，脉压变小
- E. 血压升高，脉搏变缓，脉压增大

278、内科医生王某，在春节探家的火车上遇到一位产妇临产，因车上无其他医务人员，王某遂协助产妇分娩。在分娩过程中，因牵拉过度，导致新生儿左上肢臂丛神经损伤。王某行为的性质为（ E ）

A. 属于违规操作，构成医疗事故 B. 属于非法行医，不属医疗事故 C. 属于超范围执业，构成医疗事故 D. 属于见义勇为，不构成医疗事故 E. 虽造成不良后果，但不属医疗事故

279、有恐怖分子在人员拥挤、空气流通差的地铁站喷洒液态毒素，造成人员经呼吸道吸入毒物，引起急性中毒。对中毒人员现场急救的首要措施是（ C ）

- A. 人工呼吸 B. 给与急救药物 C. 立即将患者转移脱离

现场 D、保持正确体位 E、吸氧并给与中和剂雾化吸入

280、患者，男，67 岁。胸痛 10 小时，伴冷汗淋漓，以往有高血压和主动脉夹层分离病史，体检：口唇发绀，脉搏细速，P110 次 / 分，BP70 / 50mmHg, ECG 示心肌缺血，血清淀粉酶正常，血糖正常。下列那一项最可能的诊断(E)

A. 急性出血性坏死性胰腺炎 B. 肾上腺危像 C. 糖尿病酮症酸中毒 D. 脓毒性休克 E. 心源性休克

281、患者，男，45 岁。在建筑工地不慎被蛇咬伤左手指。正确的处理方法是(A)

A. 左手指根部用绷带贴皮绷紧 B. 用止血带结扎左手前臂
C. 左臂肘关节以上，用止血带结扎 D. 用手指按压伤口
E. 用两只手指压紧左手指根部，以阻断血流

282、女性，20 岁，因低热，腹痛诊断为结核性腹膜炎，近日来呕吐，腹胀，未解大便。查体：肠鸣音亢进。最可能的并发症是(A)

A. 肠梗阻 B. 肠穿孔 C. 中毒性肠麻痹 D. 肠出血 E. 腹腔脓肿

283、男性，60 岁，因急性心肌梗死收入院。住院第二天心尖部出现 2/6~3/6 级粗糙的收缩期杂音，间断伴喀喇音，经抗缺血治疗后心脏杂音消失。该患者最可能的诊断为(A)

A. 心脏乳头肌功能失调 B. 心脏乳头肌断裂
C. 心脏游离壁破裂 D. 心脏二尖瓣穿孔 E. 心室膨胀瘤

284、3 岁男童，母亲为之穿衣牵拉右手臂后突然哭闹，不敢屈肘持物，其诊断应首先考虑(E)

- A. 右肱骨髁上骨折 B. 右肩关节脱位 C. 右肘关节脱位
D. 右腕关节脱位 E. 右桡骨头半脱位

285、体内二氧化碳分压最高的部位是：（ E ）

- A. 静脉血液 B. 毛细血管组织液 C. 动脉血液 D. 组织液
E. 细胞内液

286. 大量失血时，首先发生的反应是：（ D ）

- A. 脑和心脏的血管收缩 B. 循环血液中儿茶酚胺减少 C. 外周阻力降低
D. 外周阻力增加 E. 肾脏排出钠增多

287、胃十二指肠急性穿孔最易形成：（ A ）

- A. 右侧膈下脓肿 B. 左侧膈下脓肿 C. 盆腔脓肿 D. 肠间脓肿
E. 肝脓肿

288、脊柱骨折患者在搬运过程中，最正确的体位是：（ C ）

- A 侧卧位 B. 仰卧屈曲位 C. 仰卧过伸位 D. 俯卧位
E. 半坐卧位

289、引起食物中毒的病菌是：（ A ）

- A. 葡萄球菌 B. 链球菌 C. 肺炎链球菌 D. 脑膜炎奈瑟菌
E. 淋病奈瑟菌

290、触发神经末梢释放递质的离子是：（ C ）

- A. Na 离子 B. K 离子 C. Ca 离子 D. Mg 离子 E. Cl 离子

291、急性失血时最先出现的调节反应是：（ B ）

- A. 血管自身调节 B. 交感神经兴奋 C. 迷走神经兴奋
D. 血液中血管升压素增多 E. 血液中血管紧张素 II 增多

292、剧烈运动时，少尿的主要原因是：（ C ）

- A. 肾小球毛细血管血压增高 B. 抗利尿激素分泌增多 C. 肾小动脉收缩，肾血流量减少 D. 醛固酮分泌增多 E. 肾小球滤过膜面积减少

293、内脏痛的主要特点是：（ C ）

- A. 刺痛 B. 快痛 C. 定位不精确 D. 必有牵涉痛 E. 对牵拉不敏感

294、缺氧对呼吸的影响通过：（ B ）

- A. 中枢化学感受器 B. 外周化学感受器 C. 体液 D. 神经
E. 氢离子

295、帕金森病的主要原因是：（ D ）

- A. 脑干网状结构胆碱能系统受损 B. 脑桥蓝斑去甲肾上腺素能系统受损
C. 低位脑干 5 羟色胺能系统受损 D. 中脑黑质多巴胺能系统受损
E. 纹状体 GABA 能系统受损

296、心肌缺血时，牵涉痛常发生在：（ A ）

- A. 心前区，左肩和左上臂 B. 左上腹和肩胛间 C. 左肩胛和右肩胛
D. 上腹部和脐周围 E. 上腹部和腹股沟区

297、沙丁胺醇治疗哮喘的作用机制是：（ C ）

- A. 阻断 M 胆碱受体 B. 抑制磷酸二酯酶 C. 激动支气管平滑肌的 β 受体
D. 抑制肥大细胞释放过敏物质 E. 对抗组胺等过敏介质的作用

298、ACEI 类药降低慢性心衰死亡率的主要作用是：（ C ）

- A. 扩张外周血管 B. 减少水钠潴留 C. 逆转左心室肥大

D. 改善血流动力学 E. 改善左室射血功能

299、垂体危象时，最常见的症状为：（ A ）

A. 低血糖性昏迷 B. 低钾性麻痹 C. 谵妄 D. 脑梗死
E. 高钠高渗性昏迷

300、能使心输出量增加的因素是：（ B ）

A. 心迷走中枢紧张性增高 B. 心交感中枢紧张性增高 C. 静脉回心血量减少
D. 心室舒张末期容量减少 E. 颈动脉窦内压力增高

301、50 岁女性患者，1 小时前被自行车撞伤右膝外侧，x 线片证实为腓骨小头骨折，检查发现踝关节不能主动背伸，可能并发：（ C ）

A. 坐骨神经损伤 B. 胫神经损伤 C 腓神经损伤
D. 胫前肌撕裂伤 E. 腓骨长短肌撕裂伤

302、某心源性水肿患者，用地高辛和氢氯噻嗪治疗，2 周后患者出现多源性室性期前收缩，其主要原因是：（ A ）

A. 低血钾 B. 低血钙 C. 低血钠 D. 高血镁 E. 低氯碱血症

303、窦性心动过缓时出现早搏，药物治疗首选：（ D ）

A. 异搏定 B. 奎尼丁 C. 洋地黄 D. 阿托品 E. 苯妥英钠

304、阵发性室上性心动过速发作时，用刺激迷走神经方法治疗，下列哪项不正确：（ A ）

A. 双侧颈动脉窦按摩 B. Valsalva 动作 C. 压迫眼球
D. 面部浸于冰水中 E 刺激悬雍垂

305、脑出血最常见的原因是：（ B ）

A. 脑动脉炎 B. 高血压和脑动脉硬化 C. 血液病 D. 脑动脉瘤 E. 脑血管畸形

306、心房颤动时 f 波频率为：（ C ）

A. 300~600 次/分 B. 250~350 次/分 C. 350~600 次/分
D. 100~160 次/分 E. 250~600 次/分

307、右心衰病人常因组织液生成过多而导致下肢水肿，其主要原因是：（ B ）

A. 血浆胶体渗透压降低 B. 毛细血管血压增高
C. 组织液静水压降低 D. 组织液胶体渗透压增高
E. 淋巴回流受阻

308、在心动周期中，心室内压力上升最快的阶段是：（ B ）

A. 快速射血期 B. 等容收缩期 C. 缓慢射血期 D. 等容舒张期 E. 快速充盈期

309、关于有形成分输血特点，下列不正确的是：（ E ）

A. 一血多用 B. 提高疗效 C. 减少输血反应 D. 降低心脏负荷 E. 有效改善血容量

310、冬天某人进入浴室后不久便突然晕厥，其血流动力学的原始因素是：（ C ）

A. 全身血管收缩 B. 心输出量减少 C. 血管容量增加
D. 血流速度增加 E. 血量减少

311、胺碘酮作用机制下列正确的是（ A ）

A. 延长 APD，阻滞 Na 离子内流 B. 缩短 APD，阻滞 Na 离子内流

C. 延长 ERP, 促进 K 离子外流 D. 缩短 APD, 阻断 β 受体

E. 缩短 ERP, 阻断 α 受体

312、成人失血量 1000 毫升时: (B)

A. 血压升高, 心率加快 B. 血压降低, 心率加快

C. 血压升高, 心率减慢 D. 血压降低, 心率减慢

E. 心率和血压均无变化

313、40 岁女性患者, 外伤后患肢垂腕畸形, 各指间、掌指关节不能伸直, 拇指不能伸直, 手背桡侧皮肤感觉麻木, 考虑哪条神经损伤:

(B)

A. 尺神经 B. 桡神经 C. 正中神经 D. 腋神经 E. 肌皮神经

314、强心苷治疗心房纤颤的机制主要是: (B)

A. 缩短心房有效不应期 B. 减慢房室传导 C. 抑制窦房结

D. 直接抑制心房纤颤 E. 延长心房不应期

315、对心房纤颤无治疗作用的药物是: (C)

A. 强心苷 B. 奎尼丁 C. 利多卡因 D. 维拉帕米

E. 普萘洛尔

316、有机磷酸酯类急性中毒表现为: (D)

A. 腺体分泌减少、胃肠平滑肌兴奋 B. 膀胱逼尿肌松弛、呼吸肌

麻痹 C. 支气管平滑肌松弛、唾液腺分泌增加 D. 神经节兴奋、

心血管作用复杂 E. 脑内乙酰胆碱水平下降、瞳孔扩大

317、高血压伴心绞痛及哮喘者, 出现肾功能不全时, 最适合的治疗药物是: (C)

A. 卡托普利 B. 普萘洛尔 C. 硝苯地平 D. 氢氯噻嗪 E. 哌唑嗪

318、不属于阵发性室上性心动过速临床表现的是：（ D ）

A. 突发突止 B. 心率>150 次 / 分 C. 心律绝对规整
D. 第一心音强弱不等 E. 大部分由折返机制引起

319、有关电烧伤特点，错误的是：（ E ）

A. 皮肤的损伤轻微，而全身损伤较重
B. 主要损害心脏，引起血液动力学改变
C. 可发生电休克，甚至呼吸心跳骤停
D. 有入口和出口，均为三度烧伤
E. 深部损伤范围不超过皮肤入口处

320、大部分急性心肌梗塞的病因是：（ A ）

A. 冠状动脉内动脉粥样斑块破裂，血栓形成
B. 冠状动脉痉挛，血栓形成
C. 动脉粥样斑块逐渐进展直至完全阻塞冠状动脉管壁
D. 冠状动脉炎，血栓形成
E. 冠状动脉栓塞，激发血栓形成

321、单纯左心衰的典型体征是：（ C ）

A. 下垂性对称性水肿 B. 肝颈静脉回流征阳性
C. 双肺底闻及湿罗音 D. 胸腔积液 E. 颈静脉怒张

322、窦性心动过缓，心率不低于 50 次 / 分，常用措施为：（ E ）

A. 静滴去甲肾上腺素 B. 口服麻黄素 C. 皮下注射阿托品
D. 含服异丙肾上腺素 E. 不用药物治疗

323、区别上下消化道出血有帮助的是：（ B ）

- A. 粪便潜血阳性 B. 血尿素氮升高 C. 血肌酐升高
D. 血色素下降 E. 血氨升高

324、二度 I 型房室传导阻滞的心电图特征是：（ C ）

- A. PR 间期进行性缩短，直至一个 P 波受阻不能下传到心室
B. 相邻 PR 间期进行性延长，直至一个 P 波受阻不能下传到心室
C. PR 间期进行性延长，直至一个 P 波受阻不能下传到心室
D. PR 间期 >0.20 秒，P 波无受阻
E. PR 间期固定，P 波间断受阻不能下传到心室

325、对于无器质性心脏病无症状的室性期前收缩患者，应采取的治疗是：（ A ）

- A. 去除病因和诱因 B. 胺碘酮 C. 维拉帕米 D. 普罗帕酮
E. 美西律

326、肺心病患者出现心室颤动、心脏骤停以致突然死亡最常见的病因是：（ B ）

- A. 急性广泛心肌梗塞 B. 急性严重心肌缺氧 C. 右心功能不全
D. 左心功能不全 E. 合并脑血管意外

327、关于湿啰音的描述，正确的是：（ A ）

- A. 为吸气时气体通过气道内稀薄分泌物形成的水泡破裂声
B. 音调常高带乐音 C. 呼气时易听到 D. 持续时间长 E. 部位易变

328、肺炎伴感染性休克常见于以下肺部炎症，除了：（ E ）

A. 肺炎球菌肺炎 B. 金黄色葡萄球菌肺炎 C. 克雷伯杆菌肺炎
D. 铜绿假单胞杆菌 E. 支原体肺炎

329、合并冠状动脉痉挛性心绞痛的高血压患者宜首选：（ D ）

A. β 受体阻滞剂 B. 利尿剂 C. 血管紧张素转换酶抑制剂
D. 钙通道阻滞剂 E. α 受体阻滞剂

330、呼吸呈蒜味的毒物是：（ D ）

A. 百草枯 B. 吗啡 C. CO D. 有机磷农药 E. 亚硝酸盐

331、稽留热最常见的疾病是：（ B ）

A. 肺结核 B. 大叶性肺炎 C. 急性肾盂肾炎 D. 疟疾 E. 胸膜炎

332、急性下壁心肌梗塞最易合并：（ B ）

A. 室性期前收缩 B. 房室传导阻滞 C. 心房颤动 D. 房性
心动过速 E. 右束支传导阻滞

333、急性型 DIC 高凝期患者的治疗原则，除了消除病因、治疗原发病外，应首先考虑：（ D ）

A. 补充水与电解质 B. 应用抗血小板药物 C. 积极抗纤溶治疗
D. 及早应用肝素 E. 输注全血或血浆

334、可使肥厚型梗阻性心肌病的心脏杂音减弱的药物是：（ E ）

A. 硝酸甘油 B. 地高辛 C. 异丙肾上腺素 D. 亚硝酸异戊
酯 E. 普萘洛尔

335、水痘是由水痘病毒引起的出疹性疾病，下列哪项不正确：（ B ）

A. 任何年龄均可以感染水痘，但儿童高发，主要集中在 2~6 岁
B. 水痘为呼吸道传播，日常密切接触传播不传染。

C. 水痘潜伏期为 10~21 天, 常见为 14 天(两周左右), 所以密切接触者医学观察时间为 21 天(3 周)

D. 学校发生水痘疫情时, 首先将患者在家隔离, 同时加强晨午检, 做到早发现、早隔离、早治疗。

E. 以上都不对

336、慢性心房纤颤是指心房纤颤病史: (E)

A. 大于 24 小时 B. 大于 48 小时 C. 大于 3 天 D. 大于 1 月

E. 大于 3 月

337、风疹的潜伏期为几天: (C)

A. 7~10 B. 7~14 C. 14~21 D. 3~5 E. 1~2

338、30 岁男性, 阵发性心悸 2 年余, 突发突止, 发作时持续时间 30 分钟到 1 小时不等, 查体: 心率 200 次 / 分, 律齐, ECG 示 QRS 波群下 P 波不能明确查见, 最可能的诊断为: (E)

A. 房颤 B. 窦性心动过速 C. 房扑 D. 室扑 E. 阵发性室上速

339、洋地黄的禁忌症是: (B)

A. 扩张型心肌病 B. 肥厚梗阻型心肌病 C. 缺血性心肌病

D. 急性心肌炎 E. 风湿性心脏病

340、严重冠状动脉狭窄是指冠状动脉狭窄程度达到: (B)

A. 50%以上 B. 70%以上 C. 80%以上 D. 90%以上 E. 95%以上

341、49 岁男性, 因急性前壁心肌梗死, 溶栓后 1 小时突发心悸、晕厥伴抽搐, ECG 示 QRS 波群宽大畸形, 频率 166 次 / 分, 可见心室夺获, 治疗首选: (B)

- A. 利多卡因静注 B. 体外同步直流电复律 C. 西地兰静注
D. 异搏定静注 E. 硝酸甘油静点

342、洋地黄中毒的心电图表现最常见为：（ A ）

- A. 室性期前收缩 B. ST-T 呈鱼钩样改变 C. QT 间期缩短
D. 心房颤动 E. 房室传导阻滞

343、右心衰患者最有诊断意义的体征是：（ C ）

- A. 心率明显增快 B. 心律明显不齐
C. 胸骨左缘 3~4 肋间闻及舒张期奔马律
D. 胸骨 3~4 肋间闻及收缩期杂音
E. 肺动脉瓣区第 2 心音明显亢进

344、右心衰体循环淤血的表现是：（ E ）

- A. 端坐呼吸 B. 心源性哮喘 C. 劳力性呼吸困难
D. 阵发性夜间呼吸困难 E. 肝颈回流征阳性

345、为感染性休克的病人迅速纠正血容量不足时，下列各组液体中，
首选是：（ A ）

- A. 以平衡盐溶液为主，配合适量血浆和全血 B. 以胶体溶液为主
C. 等张生理盐水加代血浆 D. 葡萄糖溶液加代血浆
E. 全血配合葡萄糖

346、阵发性室上速的发病机制主要是：（ B ）

- A. 心肌缺血 B. 折返机制 C. 高血压病 D. 感染性心内膜炎
E. 洋地黄中毒

347、治疗急性呼吸窘迫综合征最有效的措施为：（ D ）

A. 低浓度持续吸氧 B. 高浓度吸氧 C. 正压机械通气

D. 呼气末正压通气 E. 应用糖皮质激素

348、中间综合征常发生在有机磷中毒后：（ B ）

A. 4~12 小时 B. 24~96 小时 C. 7~9 天 D. 12~24 天

E. 30~60 天

349、最可能发生晕厥的心脏瓣膜病是：（ B ）

A. 二尖瓣狭窄 B. 主动脉瓣狭窄 C. 肺动脉瓣狭窄 D. 二尖瓣

关闭不全 E. 主动脉瓣关闭不全

350、最容易发生房室传导阻滞的是：（ E ）

A. 急性前壁心肌梗塞 B. 急性前间壁心肌梗塞

C. 急性高侧壁心肌梗塞 D. 急性后壁心肌梗塞

E. 急性下壁心肌梗塞

351、急性重型胰腺炎的临床表现一般不包括：（ D ）

A. 休克 B. 呼吸衰竭 C. 发热 D. 腹泻 E. 消化道出血

352、38 岁，女性。活动后心悸，气喘 1 月余，查体轻度贫血，心率

快，律整，胸骨右缘第 2 肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音(3 / 6)，

首先应想到的疾病为：（ E ）

A. 动脉导管未闭 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 二尖瓣关闭不全

D. 室间隔缺损 E. 主动脉瓣狭窄

353、深度达皮下组织的烧伤是：（ D ）

A. I 度烧伤 B. 浅 II 度烧伤 C. 深 II 度烧伤 D. III 度烧伤

E. IV 度烧伤

354、某一急性药物中毒病人，表现为昏迷，瞳孔极度缩小，呼吸深度抑制，血压降低，出现上述中毒症状的药物是：（ B ）

A. 苯巴比妥 B. 吗啡 C. 地西洋 D. 氯丙嗪 E. 苯妥英钠

355、男，28 岁。突起寒战，高热，恶心，呕吐，腹痛已 5 天。体检：重病容，眼睑水肿，球结膜及胸部皮肤充血，腋下见少量点状出血点，血压 70 / 50mmHg，怀疑流行性出血热。本例必须首先考虑的治疗措施是：（ B ）

A. 使用升压药 B. 补充血容量 C. 纠正酸中毒 D. 小剂量肝素抗 DIC E. 选用抗病毒药物

356、男，32 岁。发现血压增高 3 年。近 1 年血压持续为 170~200 / 130~140mmHg，近 1 周头痛，视力模糊。眼底检查发现视盘水肿，最可能的诊断是：（ C ）

A. 急性视盘病变 B. 脑出血 C. 恶性高血压 D. 脑梗塞
E. 高血压脑病

357、男，35 岁。1 天前饮酒后出现上腹剧烈疼痛，伴恶心，呕吐和腹胀，尿便正常。查体：上腹偏左腹肌紧张，明显压痛腹部平片膈下未见游离气体。最可能的诊断是：（ E ）

A. 消化性溃疡穿孔 B. 肠梗阻 C. 急性阑尾炎 D. 胆石症
E. 急性胰腺炎

358、男，35 岁。入院诊断为扩张型心肌病，心功能Ⅳ级。心电图示心率 96 次 / 分，心房颤动。血清钾 6.5mmol / L，血清钠 130mmol / L。该患者不宜应用：（ B ）

A. 硝普纳 B. 螺内酯 C. 呋塞米 D. 地高辛 E. 阿司匹林

359、男，45岁。有高血压史。因阵发性心悸2天来诊。体检：血压120/70mmHg 心率180次/分，律齐，心音正常，无杂音。1分钟后心率降至80次/分，律齐。30秒后又回复至180次/分。最可能的诊断是：（C）

A. 窦性心动过速 B. 阵发性心房颤动 C. 阵发性室上性心动过速 D. 阵发性心房扑动 E. 三度房室传导阻滞

360、男，46岁。因心悸，胸痛，劳力性呼吸困难数月就诊。心电图示左室肥大，II、III、aVL、aVF导联有病理性Q波。心导管检查示左室腔与流出道间压差>20mmHg，Brockenbrough现象阳性。正确诊断是：（B）

A. 扩张型心肌病 B. 肥厚型心肌病 C. 限制型心肌病
D. 未定型心肌病 E. 特异型心肌病

361、男，64岁。胆结石术后5天突发呼吸困难1小时，有COPD史20余年。查体：BP110/80mmHg，端坐呼吸，烦躁不安，大汗，口唇发绀，双肺可闻及少量干湿罗音，心率120次/分。该患者呼吸困难最可能的原因是并发：（A）

A. 急性呼吸窘迫综合征 B. 急性左心衰 C. 继发肺部感染
D. 自发性气胸 E. 右心衰竭

362、男性，36岁。与其父吵架后服敌敌畏60ml，30分钟后被家人送到医院，神志清楚，治疗过程中最重要的措施是：（E）

A. 静脉注射地西洋 B. 应用阿托品 C. 应用解磷定

D. 应用水合氯醛 E. 彻底洗胃

363、男性，32 岁。劳累后心悸，气促。下肢水肿 6 个月。查体心界向两侧扩大，心尖区闻及 2 / 6 级收缩期杂音，两肺底有小水泡音，超声心动图示左室腔增大，心电图示完全性左束支传导阻滞。该患者应诊断为：（ B ）

A. 心包炎 B. 扩张型心肌病 C. 急性病毒性心肌炎 D. 二尖瓣狭窄 E. 肺心病

364、男性，38 岁。患肝硬化 3 年。1 周来畏寒发热，体温 38℃左右，全腹痛，腹部明显膨胀，尿量 500ml / d。住院后经检查有以下体征，对目前病情判断最有意义的是：（ D ）

A. 蜘蛛痣及肝掌 D. 腹壁静脉曲张呈海蛇头样 C. 脾肿大
D. 全腹压痛及反跳痛 E. 腹部移动性浊音阳性

365、成年男性，反复上腹痛 5 年余，平卧时加重，弯腰可减轻，查体：上腹部轻压痛，X 线腹部平片示左上腹部钙化灶，可能的诊断为：（ C ）

A. 慢性胃炎 B. 慢性胆囊炎 C. 慢性胰腺炎
D. 慢性十二指肠球部炎 E. 慢性肝炎

366、男性，48 岁。急性前壁心肌梗塞 15 小时，合并急性左心功能不全，BP170 / 100mmHg，治疗其心功能不全应首选：（ C ）

A. β 受体阻滞剂 B. 地高辛 C. 硝普纳 D. α 受体阻滞剂
E. 卡托普利

367、男性，60 岁。心前区阵发性疼痛 1 个月，多在夜间发作，与活

动无关。每次发作 15 分钟，发作时心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段抬高。首选治疗的药物是：（ C ）

- A. 硝酸酯类 B. β 受体阻滞剂 C. 钙离子通道阻滞剂
D. 洋地黄类 E. 乙胺碘呋酮

368、急性持续性腹痛，阵发性加剧并伴休克情况下，最可能的是：（ D ）

- A. 输尿管结石肾绞痛 B. 单纯性机械性肠梗阻 C. 急性阑尾炎
D. 绞窄性肠梗阻 E. 胆管蛔虫病

369、髋关节后脱位的典型畸形是髋关节：（ A ）

- A. 屈曲，内收，内旋 B. 屈曲，内收，外旋 C. 屈曲，外展，内旋
D. 屈曲，外展，外旋 E. 屈曲，外旋

370、烧伤最常见的死亡原因：（ D ）

- A. 休克 D. ARDS C. 肾功能衰竭 D 感染 E. 心功能衰竭

371、深 II 度烧伤创面处理不正确的是：（ E ）

- A. 1：2000 氯己定清洗创面，去除异物 B. 去除水疱皮
C. 油质纱布包扎创面 D. 面部创面不包扎
E. 创面使用抗菌素预防全身感染

372、头部外伤后，最常扪及皮下波动的是：（ B ）

- A. 皮下血肿 B. 帽状腱膜下血肿 C. 骨膜下血肿
D. 皮下积液 E. 皮下积脓

373、不属枕骨大孔疝的常见症状的是：（ C ）

- A. 剧烈头疼、呕吐 B. 颈项强直 C. 早期出现一侧瞳孔散大
D. 意识障碍 E. 呼吸骤停发生早

374、老年急性阑尾炎的临床特点是：（ A ）

- A. 阑尾容易缺血坏死 B. 腹痛，恶心明显 C. 常有寒战，高热
D. 右下腹压痛明 E. 显著腹肌紧张

375、抢救由心室颤动引起的心脏骤停时，最有效的方法是：（ D ）

- A. 静脉注射利多卡因 B. 皮下注射肾上腺素
C. 植人心脏起搏器 D. 非同步电击除颤 E. 口对口人工呼吸

376、骨筋膜室综合征的晚期并发症是：（ B ）

- A. 缺血性骨坏死 B. 肾功能衰竭 C. 缺血性肌痉挛
D. 不明原因发热 E. 慢性骨髓炎

377、腹部闭合性损伤时，不支持腹腔内脏器损伤诊断的是：（ E ）

- A. 早期出现休克 B. 腹膜刺激征 C 有气腹征
D. 移动性浊音阳性 E. 肠鸣音活跃

378、关于小儿急性阑尾炎，叙述错误的是：（ B ）

- A. 病情发展快且重 B. 右下腹体征明显 C 穿孔率达 30%
D. 并发症及死亡率较高 E. 宜早期手术

379、女性，26 岁，病史不清，昏迷不醒、抽搐来就诊，查体：呼吸困难、皮肤湿冷、瞳孔明显缩小，下列哪种疾病可能性大（ D ）

- A. CO 中毒 B. 阿托品中毒 C. 巴比妥类药物中毒
D. 有机磷中毒 E. 脑血管意外

380、男性，43 岁。溃疡病史 5 年，突发呕血 2 小时入院。患者出现冷汗，脉搏细数、呼吸浅促，血压下降至 80 / 40mmHg。估计出血量为：（ E ）

A. 400ml~500ml B. 500ml~600ml C. 600ml~700ml

D. 700ml~800ml E. 大于 800ml

381、流行性乙型脑炎的传播媒介：（ E ）

A. 人虱 B. 鼠蚤 C. 恙螨 D. 蜚 E. 蚊

382、男性，21 岁。右侧肢体抽搐 2 年，突然昏迷 1 小时。查体：浅昏迷，左侧肢体偏瘫。CT 示右额叶脑内血肿，临床诊断最可能是：（ D ）

A. 原发性癫痫 B. 脑动脉硬化 C. 脑动脉瘤 D. 脑血管畸形
E. 高血压脑病

383、咳嗽变异性哮喘的诊断依据正确的是（ B ）

A. 咳嗽反复发作>2 月 B. 支气管舒张试验阳性 C. 抗生素
治疗有效 D. 有过敏家族史 E. 慢性鼻炎病史

384、闭合性肋骨骨折的治疗要点是：（ A ）

A. 镇痛、防治并发症 B. 胸腔穿刺 C. 胸腔闭式引流
D. 开胸探查 E. 气管插管或是气管切开

385、不属于骨折治疗原则的做法是：（ C ）

A. 手法复位小夹板固定 B. 手术复位钢板固定 C. 促进骨折
愈合药物治疗 D. 指导病人做肌肉舒缩锻炼 E. 骨折复位后施
以管型石膏

386、不属于肱骨髁上骨折的临床表现是：（ C ）

A. 肘部疼痛肿胀 B. 肘部皮下瘀斑 C. 肘后三角异常
D. 手部皮肤苍白、皮温较低 E. 前臂缺血性肌坏死

387、恶化型劳力性心绞痛：（ A ）

A. 近 3 个月内劳力诱发的心绞痛的频率和程度加重，对硝酸甘油的需求增加

B. 心绞痛发作与体力活动无关，可出现短暂 ST 段抬高

C. 心绞痛的发作与劳累有关，其性质在 1—3 个月内无变化

D. 既往无心绞痛或是心肌梗塞史，近 1~2 个月内劳累时出现心绞痛

E. 劳累和休息均可出现的心绞痛

388、女性，25 岁。2 小时前打扫室内卫生时突然发生咳嗽、胸闷、呼吸困难，追问病史近 3 年内每年秋季常有类似发作。该病例最可能诊断为：（ D ）

A. 慢性喘息型支气管炎 B. 慢性阻塞性肺疾病(A 型)

C. 慢性阻塞性肺疾病(B 型) D. 支气管哮喘 E. 心源性哮喘

389、女性，30 岁。寒战，发热，腰痛伴尿频，尿急 3 天。体温 39℃，心肺无异常。肝脾肋下未触及。两侧肋脊角有叩击痛。尿液检查：蛋白(—)，镜检红细胞 2~5 / HP，白细胞 10~15 / HP。应诊断为：（ B ）

A. 急性膀胱炎 B. 急性肾盂肾炎 C. 急性肾小球肾炎

D. 肾结核 E. 肾结石

390、心肌梗塞 24 小时内并发急性左心衰时，最不宜应用：（ B ）

A. 吗啡 B. 洋地黄 C. 利尿剂 D. 硝酸甘油 E. 多巴酚丁胺

391、缺 O₂ 和 CO₂ 潴留对中枢神经系统可产生的影响，不包括：（ C ）

A. 出现烦躁不安、谵妄 B. 出现神志不清、昏迷

C. 导致脑组织碱中毒 D. 导致脑细胞内水肿

E. 导致脑间质水肿

392、急性呼吸窘迫综合征最重要的诊断依据是：（ C ）

- A. 呼吸频率增加，每分钟大于 28 次 B. 肺泡气—动脉血氧分压差降低
C. 氧合指数 ≤ 200 D. 肺内分流量减少
E. 血气分析显示为低氧伴轻度二氧化碳潴留

393、颅内高压症所致呕吐的特点：（ B ）

- A. 喷射性，有恶心、呕吐后轻松 B. 喷射性，无恶心、呕吐后不轻松
C. 非喷射性，有恶心、呕吐后轻松 D. 非喷射性，无恶心、呕吐后轻松
E. 喷射性，无恶心、呕吐后轻松

394、腰椎间盘突出症的典型症状是：（ C ）

- A. 腰背痛 B. 下肢无力 C. 腰痛伴坐骨神经痛 D. 坐骨神经痛
E. 腰部活动受限

395、下面哪个是引起急性胆囊炎的常见病因是：（ C ）

- A. 胆管蛔虫进入胆囊 B. 胆囊息肉继发感染 C. 胆囊结石堵塞胆管
D. 胰腺炎致胰液反流 E. 胆总管下端梗阻

396、发生闭合性气胸，当肺萎缩多少时不需要胸腔引流（ A ）

- A. 20~30% B. 30%~40% C. 40%~50% D. >50% E. >60%

397、突发公共卫生事件 III 级预警所对应的颜色：（ C ）

- A. 红色 B. 橙色 C. 黄色 D. 蓝色 E. 绿色

398、一次事件出现重大人员伤亡，其中，死亡和危重病例超过（ C ）例的突发公共事件，称为重大突发公共事件。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 10

399、火灾中毒中对人员危害最大的是(A)

- A. 呼吸道吸入 B. 皮肤接触 C. 烧伤 D. 消化道误食
E. 以上都是

400、卫生部依照职责和国家突发公共卫生事件应急预案，规定(A)统一领导，负责组织、协调全国突发公共卫生事件应急处理工作。

- A. 国务院 B. 卫生部 C. 各省卫生厅 D. 各省省委办公室
E. 各地市市委办公室

401、脊髓横断性损害引起感觉障碍的特点是(B)

- A. 形状不规则的条块状感觉障碍
B. 受损节段平面以下双侧深浅感觉缺失
C. 受损节段平面以下双侧痛温觉缺失并伴自发性疼痛
D. 受损节段平面以下双侧感觉异常和感觉过敏
E. 受损节段平面以下双侧痛温觉缺失而触觉及深感觉保留

402、梨形心脏见于(B)

- A. 主动脉瓣狭窄 B. 二尖瓣狭窄 C. 肺动脉瓣狭窄
D. 三尖瓣狭窄 E. 动脉导管未闭

403、骑跨式外伤最易损伤尿道是：(B)

- A. 阴茎部 B. 球部 C. 膜部 D. 前列腺部 E. 膜上部

404、下列关于张力性气胸的病理生理改变中哪项是错误的：(B)

- A. 较大较深的肺裂伤，裂口形成活瓣 B. 纵膈左右摆动 C. 严重呼吸循环障碍
D. 严重皮下气肿形成 E. 伤侧和健侧均被严重挤压

405、男，38 岁，右下胸撞伤 6 小时，伤后感上腹部疼痛，头晕。
查:BP90/70mmHg，P110 次/分，面色苍白，右腹部压痛、反跳痛、肌紧张较明显。X 线透视示肝阴影扩大、右膈抬高。首先应考虑的诊断是：（ B ）

- A. 外伤性血气胸 B. 肝破裂 C. 右肾破裂 D. 结肠肝区破裂
E. 胃十二指肠穿孔

406、预激综合征合并快速心房颤动，治疗选用：（ E ）

- A. 地尔硫卓 B. 洋地黄 C. 阿托品 D. 利多卡因 E. 胺碘酮

407、大面积烧伤 24 小时内的病人，首选的主要治疗措施是（ C ）

- A. 处理创面 B. 镇静止痛 C. 液体复苏 D. 控制感染
E. 补充营养，增强免疫

408、继发性腹膜炎的腹痛特点是 （ C ）

- A. 阵发性全腹绞痛 B. 逐渐加重的阵发性腹痛 C. 剧烈、持续性全腹痛，原发部位显著 D. 高热后全腹痛 E. 腹痛伴肠鸣音亢进

409、胸腔积液需要在多少毫升以上才有 X 线表现 （ C ）

- A. 50～100ml B. 100～150ml C. 200～250ml D. 300～350ml E. 400～450ml

410、成年人因失血致意识模糊、血压测不到，估计失血量：（ B ）

- A. 大于 800ml B. 大于 1000ml C. 大于 1200ml
D. 大于 1400ml E. 大于 1600ml

411、下列不属于阿托品化指标的是（ A ）

- A. 心率减慢 B. 颜面潮红 C. 瞳孔较前增大
D. 肺部啰音减少 E. 口干、皮肤干燥

412、电击伤主要损害：（ A ）

- A. 心脏 B. 肺 C. 肝 D. 肾 E. 皮肤

413、多根多处肋骨骨折患者，最典型的症状和体征是：（ D ）

- A. 疼痛剧烈 B. 呼吸困难 C. 伤处肿胀青紫
D. 反常呼吸运动 E. 胸廓挤压痛

414、关于高压蒸汽灭菌法，不正确的描述是（ D ）

- A. 灭菌效果更可靠 B. 适用于对耐高温和耐湿物品的灭菌
C. 可杀灭包括细菌芽胞在内的所有微生物 D. 通常灭菌压力为
2.05kg/cm² E. 通常灭菌温度为 121.3℃

415、大面积严重烧伤病人转运前应首先：（ C ）、

- A. 持续中心静脉压测定 B. 彻底清创 C. 建立输液途径
D. 消毒敷料包扎创面以免再感染
E. 汽车运送时伤员应与行使方向平行

416、骨折的急救不包括：（ E ）

- A. 一般处理 B. 创口包扎 C. 妥善固定
D. 迅速运输 E. 开放性骨折复位

417、咳嗽但无痰可见于（ D ）

- A. 急性支气管炎 B. 慢性支气管炎 C. 支气管扩张 D. 气
胸 E. 支气管内膜结核

418、一风湿性心脏病二尖瓣狭窄患者，突然出现心悸、脉搏短绌，

该患者最可能的心率是（ B ）

- A. 正常心律 B. 心房颤动 C. 心房扑动
D. 心室颤动 E. 房性过早搏动

419、急性阑尾炎常见的最典型临床表现是：（ D ）

- A. 阵发性右下腹疼痛 B. 腰大肌试验阳性 C. 发热
D. 转移性右下腹痛 E. 恶心呕吐

420、急性颅内压增高，有脑疝征像时，应立即使用的最佳药物是：
（ B ）

- A. 25%山梨醇 B. 20%甘露醇 C. 50%葡萄糖
D. 50%甘油 E. 激素

421、下列哪项是骨折的晚期并发症 （ D ）

- A. 血管损伤 B. 神经损伤 C. 骨筋膜室综合征 D. 创伤性
关节炎 E. 脂肪栓塞

422、健康人生理无效腔与潮气量的比值（ V_d/V_t ）是：（ B ）

- A. 0.20~0.30 B. 0.25~0.33
C. 0.33~0.45 D. 0.35~0.40 E. 0.40~0.50

423、低渗性缺水时，在血清钠尚未明显降低之前，尿钠含量（ E ）

- A. 正常 B. 略高 C. 时高时低 D. 逐渐升高 E. 减少

424、某工地施工时不慎塌方，引起工伤事故，对严重损伤病人的处理首先是（ C ）

- A. 抗休克 B. 止血、骨折固定 C. 防治窒息
D. 镇静止痛 E. 抗感染

425、下列关于清创的原则中，错误的是（ E ）

- A. 清除伤口内异物
- B. 切除失去活力的组织
- C. 彻底止血
- D. 根据情况缝合伤口
- E. 必须放置引流

426、深 II 度烧伤创面处理不正确的是：（ B ）

- A. 1：2000 氯己定清洗创面，去除异物
- B. 去除水疱皮
- C. 油质纱布包扎创面
- D. 面部创面不包扎
- E. 创面使用抗菌素预防全身感染

427、骨盆骨折的并发症不包括（ C ）

- A. 直肠损伤
- B. 坐骨神经损伤
- C. 脊髓损伤
- D. 膀胱随上
- E. 腹膜后血肿

428、急性尿潴留病因中，属于机械性梗阻的是（ E ）

- A. 腰麻和肛管直肠术后
- B. 外伤性高位截瘫
- C. 使用药物阿托品、普鲁本辛后
- D. 腹泻或长期使用利尿剂
- E. 尿道结石

429、关于休克病人预防急性肾衰竭的措施，不正确的是：（ E ）

- A. 及时纠正低血容量性休克，避免肾缺血
- B. 矫治休克时不宜使用易引起肾血管收缩的药物
- C. 对有溶血倾向的病人应保持肾小管通畅
- D. 休克合并 DIC 时，要及时应用肝素治疗
- E. 病人只要出现尿量减少时，要及时使用利尿剂

430、诊断颅内血管性疾病的金标准是（ E ）

A. CT B. CTA C. MR D. MRA E. DSA

431、战伤救护中，遇肠管脱出体外，转运前下列处理最恰当的是（ D ）

- A. 立即送回腹腔，包扎伤口
- B. 缝线缝扎固定肠管与腹壁再行包扎
- C. 直接用急救包覆盖包扎固定
- D. 敷料覆盖再以钟形器皿盖住再包扎
- E. 以生理盐水冲洗后常规包扎保护

432、关于关节脱位特有体征的叙述，哪项是正确的（ E ）

- A. 肿胀、畸形、功能障碍 B. 压痛、肿胀、淤斑 C. 畸形、反常活动、关节空虚
- D. 畸形、反常活动、弹性固定 E. 畸形、弹性固定、关节空虚

433、脑震荡突出的表现有（ E ）

- A. 一过性抽搐 B. 持续性昏迷 C. 短暂性失语 D. 喷射性呕吐
- E. 逆行性遗忘

434、患甲类传染病如鼠疫、霍乱，乙类传染病如肺炭疽、传染性非典型肺炎及一切传播途径不明的传染者，应实行严密隔离，用下列哪一种颜色来隔离标志？（A）

- A. 黄色 B. 蓝色 C. 棕色 D. 橙色 E. 红色

435、突发公共卫生事件报告时限规定，省政府向卫生部报告为（B），其他每个环节为（B）小时。

- A. 1、1 B. 1、2 C. 2、1 D. 2、2 E. 2、3

436、因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后据实补记，并加以注明，其时限规定为（ C ）

- A、2 小时内 B、4 小时内 C、6 小时内
D、8 小时内 E、12 小时内

437、《执业医师法》明确规定，医师在执业过程中应当履行的职责是（ D ）

- A、以病人为中心，实行人道主义精神
B、防病治病，救死扶伤
C、遵守职业道德，保护患者隐私
D、树立敬业精神，尽职尽责为患者服务
E、防病治病，救死扶伤，保护人民健康

438、发现鼠疫疑似病例后，应以最快的通讯方式向当地疾病预防控制中心报告，报告的时限为：（ C ）

- A、城市 2 小时内，农村 4 小时内 B、城市 4 小时内，农村 6 小时内
C、城市 2 小时内，农村 2 小时内 D、城市 12 小时内，农村 24 小时内
E、城市 6 小时内，农村 12 小时内

439、学校发生群体性不明原因疾病或者其它突发公共卫生事件时，学校疫情报告人应当在（ B ）小时内报出相关信息。

- A. 1 B. 2 C. 6 D. 24 E. 4

440、单位或者个人违反《中华人民共和国突发事件应对法》规定，导致突发事件发生或者危害扩大，给他人人身、财产造成损害的，应当依法承担（ A ）。

A、民事责任 B、刑事责任 C、行政责任

D、经济责任 E、 以上都不对

441、急性重度有机磷杀虫药中毒患者，经抢救治疗后，于发病第 3 天胆碱能危象消失，“阿托品化”保持良好。此时，突感呼吸困难，睁眼、抬头无力。查体：神志清楚，听诊两肺呼吸音减弱，未闻及干、湿性啰音，双侧病理征阳性， $\text{Sao}_2\%$ 为 84%。该患者最有可能的并发症是（ D ）

A. 急性中毒性脑病 B. 有机磷杀虫药中毒“反跳”

C. 阿托品中毒 D. 中间肌无力综合症 E. 迟发性周围神经病

442、哪一类药物中毒最易出现谵妄：（ B ）

A. 磺胺类 B. 抗组胺类 C. 三环类

D. 吩噻嗪类 E. 苯二氮卓类

443、对有呼吸和循环体征而无应答患者，首先应采取的措施下列哪项正确：（ D ）

A. 仰卧位 B. 俯卧位 C. 恢复体位

D. 昏迷体位 E. 头低足高位

444、不能在同一输液管道内同时给予碱性液体的药物是（ C ）

A. 间羟胺 B. 肾上腺素 C. 多巴胺

D. 血管升压素 E. 多巴酚丁胺

445、判断休克的指标除外哪项（ E ）

A. 血压 $<12\text{Kpa}$ B. 脉压 $<4\text{Kpa}$ C. 神志改变

D. 尿量 $<30\text{ml/h}$ E. 脉率 <100 次/分

446、腹内脏器损伤，哪项不正确（ D ）

- A. 有恶心、呕吐、便血、气腹者，多为胃肠道损伤
- B. 排尿困难、血尿、外阴或会阴部牵涉痛者，提示泌尿系统脏器损伤
- C. 内出血及同侧后背部牵涉痛常见于肝脾破裂
- D. 有休克者多为实质器官损伤
- E. 肝破裂，胆囊管损伤常有明显腹膜炎

447、心肌微循环灌注的决定因素是（ E ）

- A. 心肌收缩力 B. 心排出量 C. 心排血指数
- D. 动脉收缩压 E. 动脉舒张压

448、急性肾衰竭最常见的诱发因素是（ E ）

- A. 劳累 B. 感染 C. 饮食中蛋白质过量
- D. 有效循环血量减少 E. 应用肾毒性药物

449、符合休克不可逆期微循环特点的是（ B ）

- A. 毛细血管前括约肌、微动脉、微静脉均保持收缩
- B. 毛细血管前括约肌、微动脉、微静脉松弛
- C. 毛细血管前括约肌、微动脉松弛，微静脉收缩
- D. 毛细血管前括约肌和微动脉收缩，微静脉松弛
- E. 微循环血管对儿茶酚胺的反应性不变

450、室性颤动或无脉性室性心动过速经电击除颤或肾上腺素治疗无效时，可给予大剂量的利多卡因，其剂量是（ C ）

- A. 2mg/kg B. 3mg/kg C. 1.5mg/kg
- D. 2.5mg/kg E. 3.5mg/kg

451、各型休克的特点：（ A ）

- A. 有效循环血容量不足 B. 尿少 C. 低血压
- D. 代谢性酸中毒 E. 昏迷

452、多巴酚丁胺的主要药理作用是激动下列哪个受体：（ E ）

- A. α 受体 B. 平滑肌 V2—受体 C. 多巴胺 R1
- D. 多巴胺 R2 E. β 受体

453、关于呼吸困难的描述，下列哪项不正确？（ E ）

- A. 病人主观上有空气不足、呼吸费力的感觉
- B. 可见患者出现呼吸频率、幅度和节律的改变
- C. 病人用力呼吸，可见辅助呼吸肌参与呼吸运动
- D. 严重者可呈端坐呼吸及发绀
- E. 引起呼吸困难的原因就是呼吸系统或循环系统疾病

454、关于医德规范，下列提法中错误的是（ C ）

- A. 调节医务人员人际关系的出发点和根本准则
- B. 医务人员行为的具体医德标准
- C. 社会对医务人员行为的基本要求
- D. 医德原则的具体体现和补充
- E. 把医德理想变成医德实践的中间环节

455、对肾综合征出血热来说，下列哪项是错误的（ E ）

- A. 是自然疫源性疾病 B. 野生鼠类是主要传染源 C. 病原体是 RNA 病毒
- D. 可经过呼吸道传播 E. 每年 7~9 月份为流行高峰

456、关于胰腺炎诊断中血、尿淀粉酶检测叙述不正确的是：（ E ）

- A. 血清淀粉酶值在发病后 3~12 小时开始升温, 24~48 小时达到高峰, 7 天内恢复正常
- B. 尿淀粉酶升高稍迟但持续时间比血淀粉酶长
- C. 淀粉酶值的高低与病情的轻重不一定成正比
- D. 严重的坏死性胰腺炎, 血、尿淀粉酶值反而不升高
- E. 以上叙述都不对

457、妊娠合并心脏病, 发病率最高的是 (A)

- A. 风湿性心脏病 B. 贫血性心脏病 C. 高血压性心脏病
- D. 先天性心脏病 E. 围生期心脏病

458、以下哪项不属于 COPD 的合并症 (C)

- A. 心血管疾病 B. 骨质疏松 C. 肺心病
- D. 肺癌 E. 焦虑和抑郁

459、属于分娩概念的项目, 正确的是 (B)

- A. 妊娠 28 周及 28 周以内分娩为流产 B. 临产后胎儿死亡为死产
- C. 妊娠满 28 周至不满 37 足周期间分娩为早产 D. 妊娠 38 周至 42 周分娩为足月产
- E. 妊娠 42 周之后分娩为过期产

460、月经量过多是指月经周期基本正常, 以经量明显增多为主的病症。其经血以超过多少为月经过多: (B)

- A. 平时月经量 B. 80ml C. 100ml D. 120ml E. 以上都不对

461、呼吸衰竭导致肺心病发生的主要原因是 (E)

- A. 缺氧使脑血管扩张 B. 缺氧使血管壁通透性增高 C. 缺氧

使细胞内 ATP 生成减少 D. 缺氧导致细胞内酸中毒 E. 二氧化碳分压升高导致脑血流增加和脑细胞酸中毒

462、下列哪项是骨折的专有体征：（ B ）

A. 发热 B. 骨摩擦音 C. 疼痛 D. 肿胀 E. 功能障碍

463、关于早产儿特点，哪项是错误的：（ E ）

A. 出生体重一般 $<2500\text{g}$ B. 皮肤红润，胎毛多，足底纹少
C. 呼吸不规则，常出现暂停现象 D. 生理性黄疸持续时间较长
E. 肌张力较高

464、我国现在引起慢性肾衰竭的病因最常见的是 （ E ）

A. 慢性肾盂肾炎 B. 肾结核 C. 肾结石 D. 肾小动脉硬化
E. 慢性肾小球肾炎

465、心脏病孕妇最危险时期是（ C ）

A. 妊娠 24~27 周 B. 妊娠 28~31 周 C. 妊娠 32~34 周
D. 妊娠 35~38 周 E. 产褥期 7 天之后

466、下列哪项不是胸部创伤紧急手术的指征（ A ）

A. 心肌挫伤，心源性休克 B. 急性心包填塞 C. 气管支气管
断裂 D. 胸内大量活动性出血 E. 膈肌或食管破裂

467、引起 I 型呼吸衰竭的常见病因是 （ A ）

A. 肺部广泛炎症 B. 慢性支气管炎 C. 慢性阻塞性肺疾病
D. 肺源性心脏病 E. 上呼吸道阻塞

468、伤寒最具特征性的病变部位在：（ D ）

A. 肝、胆囊 B. 肠系膜淋巴结 C. 结肠 D. 回肠下段集合

淋巴结与孤立淋巴滤泡 E. 乙状结肠

469、下列哪项不符合慢性浅表性胃炎胃镜下表现：（ C ）

A. 胃黏膜呈花斑状 B. 常有灰白色或黄白色渗出物 C. 黏膜皱襞变细或平坦 D. 可见黏膜充血、水肿、糜烂或出血 E. 常以胃窦部最为明显

470、下列哪项不是我国上消化道出血最常见的病因：（ B ）

A. 急性胃炎 B. 胃黏膜脱垂症 C. 胃癌 D. 消化性溃疡 E. 曲张的食管静脉破裂

471、胎心变化中与胎儿窘迫无关的是（ E ）

A. 胎心变异减速 B. 胎心率<120 次/分 C. 胎心率>160 次/分 D. 胎心晚期减速 E. 胎心早期减速

472、下列哪项不是属于消化性溃疡的主要并发症：（ C ）

A. 癌变 B. 穿孔 C. 恶性贫血 D. 出血 E. 幽门梗阻

473、有关协调性子宫收缩乏力，下列描述正确的是（ A ）

A. 子宫收缩节律性、对称性和极性均正常，仅收缩力减弱 B. 容易发生胎儿宫内窘迫 C. 不宜静脉点滴缩宫素 D. 潜伏期不宜应用哌替啶 E. 多数产妇自觉持续性腹痛，产程延长

474、对脑卒中偏瘫患者进行患肢关节被动活动时，若不注意，最易造成周围软组织损伤的关节是（ C ）

A. 肘关节 B. 膝关节 C. 肩关节 D. 腕关节 E. 踝关节

475、各种流产的临床特点，哪项是正确的：（ A ）

A. 先兆流产：宫口闭，出血量少 B. 完全流产：腹痛，宫口松

C. 难免流产:出血少,未破水 D. 不全流产:宫口闭,出血减少

E. 过期流产:胚胎死亡达1个月以上尚未排出者

476、足月婴儿臀位产,生后第二天突然抽搐、尖叫。查体:前囟饱满、肌张力低、唇微绀,心率132次/分,肺未闻及啰音。化验:白细胞 $10.0 \times 10^9/L$,中性核55%,血钙 $2mmol/L$,最可能的诊断是 (B)

A. 低钙血症 B. 颅内出血 C. 败血症 D. 化脓性脑膜炎
E. 肺炎

477、急性腹膜炎发生严重休克的主要因素为 (B)

A. 水和电解质紊乱 B. 血容量减少和吸收大量毒素 C. 腹腔内有无原发病灶
D. 发病年龄不同 E. 腹膜有无刺激征

478、下列二尖瓣狭窄患者的体征中,错误的是 (C)

A. 二尖瓣面容 B. 心尖区第一心音亢进 C. 可闻及第三心音
D. 心尖部舒张期杂音 E. 触及舒张期震颤

479、2岁的小儿,因咳嗽、高热、呼吸困难伴呕吐腹泻3天就诊,查体: $T40^{\circ}C$,精神差,烦躁不安, $R52$ 次/分, $P154$ 次/分,口唇紫绀,鼻扇和三凹征明显,肺部听诊无明显湿罗音,X线检查呈线条状或单条状阴影增生,有的相互交叉成网状,伴有小点状致密影,该病可能为: (A)

A. 间质性肺炎 B. 毛细支气管炎 C. 腺病毒肺炎
D. 金黄色葡萄球菌肺炎 E. 衣原体肺炎

480、吗啡镇痛作用机制是 (D)

A. 激动中脑盖前核的阿片受体 B. 阻断大脑边缘系统的阿片受体

C. 激动大脑边缘系统的阿片受体 D. 激动脑室导水管周围灰质的阿片受体
E. 阻断脑室导水管周围灰质的阿片受体

481、下列哪项不是骨折体征：（ A ）

A. 弹性固定 B. 反常活动 C. 疼痛、肿胀 D. 骨擦音 E. 畸形

482、肝癌的临床表现中，提示属晚期的表现是（ D ）

A. 腹胀、乏力 B. 肝区疼痛 C. 食欲不振 D. 肝区肿块
E. 体重下降

483、诊断胎儿宫内窘迫的依据不包括：（ E ）

A. 胎心音不规律， < 100 次/分 B. 胎动频繁 C. 羊膜镜检羊水
水深绿色 D. 胎儿头皮血 Ph E. 以上都不是

484、流产的定义是（ B ）

A. 妊娠 < 37 周，胎儿体重 < 2500 克而终止妊娠
B. 妊娠 < 28 周，胎儿体重 < 1000 克而终止妊娠
C. 妊娠 < 24 周，胎儿体重 < 1500 克而终止妊娠
D. 妊娠 < 24 周，胎儿体重 < 1000 克而终止妊娠
E. 妊娠 < 20 周，胎儿体重 < 500 克而终止妊娠值 < 7.20 克

485、老人跌倒后不敢站立提示：（ B ）

A. 股骨干骨折 B. 股骨颈骨折 C. 股骨转子间骨折
D. 膝关节韧带断裂 E. 膝关节半月板损伤

486、以下哪项是高血压脑出血主要危险因素（ C ）

A. 糖尿病或血糖增高 B. 血清胆固醇增高 C. 突然血压增高
D. 脑动脉硬化 E. 吸烟，饮酒

- 487、在骨髓或骨髓内抽得脓液后，最关键的治疗措施是（ A ）
- A. 局部引流 B. 多次抽脓并注入抗生素 C. 脓液细菌培养及药敏试验，依结果调整用药 D. 局部固定防止病例骨折
- E. 联合使用大量抗生素
- 488、下列慢性胃炎的病理改变，属于癌前病变的是（ D ）
- A. 粘膜重度萎缩，腺体减少 B. 假幽门腺化生 C. 肠上皮化生
- D. 重度不典型增生 E. 淋巴滤泡增生
- 489、子宫脱垂的防治不正确的是（ B ）
- A. 积极治疗慢性咳嗽、便秘 B. 禁止参加体力劳动 C. 避免或减少产伤
- D. 脱垂轻者可放置子宫托 E. 伴阴道壁膨出者可手术治疗
- 490、子宫内膜异位症常见的症状不包括：（ A ）
- A. 原发性痛经 B. 慢性盆腔痛 C. 性交痛 D. 月经异常
- E. 急腹痛
- 491、下列哪项不是甲亢的诊断要点：（ A ）
- A. 甲状腺抗体阳性 B. 性情急躁，易激动 C. 有突眼征
- D. 两手颤动 E. 甲状腺肿大，常可扪及震颤或听到血管杂音
- 492、在疟疾的表现中（典型）下列哪项是错误的：（ D ）
- A. 定时性，周期性寒热，大汗发作 B. 有完全缓解间歇
- C. 脾肿大 D. 白细胞增多，中心粒细胞升高 E. 贫血
- 493、下列哪种方法诊断妊娠最可靠：（ C ）
- A. 停经史，胎动感，腹部膨隆

- B. 早孕反应，双合诊子宫增大，尿 HCG 阳性
- C. 停经史，双合诊子宫增大，B 超宫内见妊娠囊
- D. 停经史，早孕反应，B 超宫内见光团
- E. 停经史，早孕反应，子宫增大

494、子宫收缩乏力引起产后出血，止血措施有：（ E ）

- A. 按摩子宫
- B. 使用宫缩剂
- C. 子宫动脉结扎或行子宫动脉栓塞
- D. 子宫切除术
- E. 以上均是

495、男，47 岁，突然神志丧失，呼吸不规律，即刻进行心脏按压，判断其是否有效的主要方法是（ D ）

- A. 测血压
- B. 呼喊病人看其是否清醒
- C. 摸桡动脉搏动
- D. 摸股动脉搏动
- E. 观察末梢循环状况

496、向患者解释医学问题，首先应该做的是（ C ）

- A. 直接告诉患者疾病的预后
- B. 介绍疾病诊断的程序
- C. 了解患者对疾病知道多少
- D. 交代诊断、病因和治疗
- E. 请患者和家属选择治疗方法

497、对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况，依法享有定期考核权的单位是（ C ）

- A. 县级以上人民政府
- B. 县级以上人民政府卫生行政部门
- C. 县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或组织
- D. 医师所在地的医学会或者医师学会

498、主管全国母婴保健工作的部门是（ D ）

- A. 各级人民政府
- B. 各级人民政府卫生行政部门
- C. 国家计

划生育主管部门 D. 国务院卫生行政部门 E. 国家妇女联合会

499、医师未取得处方权开具药品处方的，由县级以上卫生行政部门责令暂停执业活动的时间为（ B ）

A. 六个月 B. 六个月以上一年以下 C. 一年 D. 三个月以上六个月以下 E. 三个月

500、下列哪项是指从不同的医学伦理价值观出发，医师可以合乎逻辑地得出两种甚至两种以上的不同程度诊疗行为方案：（ B ）

A. 临床决策 B. 医学伦理难题 C. 医学伦理决策
D. 医德教育 E. 医德评价

二、A2 题（共 50 题）

1. 男性，49 岁，4 小时前，上腹剧烈疼痛。查体：上腹压痛，为明确诊断下列哪项检查是不必要的（ E ）

A. 心电图 B. 血淀粉酶 C. X 线腹部平片 D. 肝胆胰 B 超检查 E. 尿淀粉酶

2. 支气管扩张患者清晨突然咯血 300ml，中午 T:37.4℃，伴左侧胸闷，你考虑最可能是下列哪种情况（ D ）

A. 神经过度紧张 B. 潜在结核病变播散 C. 肺内继发感染
D. 血块阻塞气道 E. 心脏方面可能有问题

3. 男，30 岁，重症感染病人，每天上午 10 点出现寒战、高热，已连续五天。疑有败血症，应做血培养。最佳抽血时间应在（ B ）

A. 出现寒战时 B. 预计发生寒战及发热前

C. 寒战后体温升至最高时 D. 体温正常后 1 小时

E. 体温正常后半小时

4. 男，75 岁，排尿困难 5 年，尿线细，射程短，排尿时间长。一天前突发不能自行排尿，下腹区胀痛难忍，应先行（ B ）

A. 输液抗感染 B. 导尿 C. 前列腺切除术 D. 针刺 E. 理疗

5. 女，60 岁，心肌梗死 2 个月后，仍心悸、气短、咳嗽、腹胀、尿少。检查：心界向左扩大，心尖部搏动弥散，心音低钝，心尖区收缩期杂音 3/6 级。心电图示原心梗部位 ST 段仍抬高 0.3mV 左右。超声心动图示左室扩大，左室心尖部圆顿变薄，收缩期向外膨出。临床诊断为（ D ）

A. 陈旧性心肌梗死 B. 急性心肌梗死 C. 左心衰竭

D. 室壁瘤 E. 右心衰竭

6. 男性，28 岁，3 天前淋雨受凉后畏寒、发热、咳嗽，气短，胸痛，既往有结核性胸膜炎病史。查体：左肺下部叩诊呈浊音，可闻及湿罗音，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 92%，胸片左肺下叶大片致密阴影，考虑诊断为（ D ）

A. 浸润性肺结核 B. 阻塞性肺炎 C. 肺脓肿 D. 细菌性肺炎 E. 病毒性肺炎

7. 女性，65 岁，急性下壁、正后壁心肌梗死。当晚意识突然丧失、抽搐，心电图发现有窦性停搏和 III 度房室传导阻滞，此时应首先考虑哪项措施（ E ）

A. 扩血管药物 B. 异丙基肾上腺素 C. 阿托品 D. 抗凝治

疗 E. 安装临时起搏器

8. 女性，25 岁。3 年来反复晕厥，数分钟即恢复，查体：坐位时心尖闻及舒张期隆隆样杂音，卧位时该杂音消失，最可能的诊断是（E）

A. 风心病二尖瓣狭窄 B. 心脏神经官能症 C. 肺心病
D. Austin-Flint 杂音 E. 左房粘液瘤

9. 女，60 岁，患乙肝 6 年，昨天起家属发现唤不醒而送院。检查：神智完全丧失，不能唤醒，腱反射和肌张力亢进，扑翼样震颤不能引出，脑电图明显异常。最可能的诊断是（E）

A. 肝性脑病 0 期 B. 肝性脑病 1 期 C. 肝性脑病 2 期 D. 肝性脑病 3 期
E. 肝性脑病 4 期

10. 男，44 岁。年轻时曾患肝炎，工作表现正常。自己驾车上下班，近 2 个月对交通信号及道路情况的应变能力下降。来院检查：应答及计算能力正常，脑电图（-），听觉诱发电位异常。最可能的诊断是（A）

A. 肝性脑病 0 期 B. 肝性脑病 1 期 C. 肝性脑病 2 期 D.
肝性脑病 3 期 E. 肝性脑病 4 期

11. 一腹壁静脉曲张患者，脐以上血流方向由下至上，脐以下血流方向由上至下，该患者应考虑为（C）

A. 上腔静脉阻塞 B. 下腔静脉阻塞 C. 门静脉高压或门静脉阻塞
D. 髂内静脉阻塞 E. 髂外静脉阻塞

12. 女，45 岁，幽门梗阻行持续胃肠减压半月余，每日补 10%葡萄糖 2500ml，5%葡萄糖盐水 1000ml，10%氯化钾 30ml。2 天前开始出现全腹膨胀，无压痛及反跳痛，肠鸣音消失，每日尿量 1500ml 左右，最

可能的原因是（ A ）

- A. 低钾血症 B. 低钠血症 C. 高钾血症 D. 高钠血症
E. 低钙血症

13. 一男性患者 40 岁，6 小时前发生十二指肠壶腹（球部）溃疡前壁穿孔，以下症状及体征中，不应出现的是（ B ）

- A. 全腹压痛及肌紧张 B. 肠鸣音亢进 C. 肝浊音界消失
D. 呼吸浅快，腹肌呈板样 E. 发热及白细胞计数上升

14. 男，40 岁。患糖尿病 10 余年，尿蛋白阴性，近 1 个月感下腹部胀，排尿不畅伴尿失禁，B 超显示“膀胱扩大尿潴留”，其原因考虑是（ A ）

- A. 糖尿病自主神经病变 B. 糖尿病合并泌尿系感染 C. 糖尿病合并慢性前列腺炎
D. 糖尿病肾病 E. 糖尿病合并泌尿系结石

15. 女性，42 岁。患有风湿性心脏病多年，近 1~2 年来活动时心慌气短，有时少量咯血，经超声心动图检查示二尖瓣口有效面积 $<1.5\text{cm}^2$ ，无活动风湿的临床及化验指征。该患者最佳的治疗方案是（ A ）

- A. 经皮球囊二尖瓣成形术 B. 人工瓣膜置换术 C. 地高辛治疗
D. 利尿剂治疗 E. 预防呼吸道感染，避免体力活动

16. 林某，女，76 岁。高血压史 15 年。今上午突然昏倒，深度昏迷，口角流涎，喉中痰鸣，口舌歪斜，左侧肢体硬瘫。查体：血压 200/120mmHg。实验室检查：头颅 CT 诊断意见是“内囊出血”，如下治疗措施中，哪项是错误的（ D ）

- A. 降压 B. 脱水剂 C. 止血剂 D. 抗凝剂 E. 吸氧

17. 患者，男，50 岁。神志不清 1 天急诊入院。检查：无自主运动，不能被唤醒，对痛觉刺激尚有反应，角膜反射、瞳孔对光反射、眼球运动、吞咽反射均存在。此患者的意识障碍类型是（ D ）

A. 嗜睡 B. 意识模糊 C. 昏睡 D. 浅昏迷 E. 深昏迷

18. 男，45 岁。因肝硬化（失代偿期）入院。1 天前出现明显呼吸困难，查体：体温正常，双肺呼吸音清，血气分析示低氧血症。抗感染治疗无效。最可能发生的并发症是（ C ）

A. 肺炎 B. 肝肾综合征 C. 肝肺综合征 D. 支气管哮喘 E. 急性左心衰

19. 男性患者，65 岁，吸烟史 40 多年，慢性咳嗽咳痰史 10 多年，活动后胸闷气促 5 年，进行性加重就诊。首先应做哪项检查（ C ）

A. 心电图 B. 肺 CT C. 肺功能 D. 动脉血气 E. 心脏超声检查

20. 男性，38 岁，4 小时前曾大量饮酒，出现上腹剧烈疼痛。弯腰体位可减轻。上腹部压痛，轻微腹肌紧张，最可能的诊断是（ C ）

A. 急性胃炎 B. 急性胃肠炎 C. 急性胰腺炎 D. 急性胆囊炎 E. 急性肠梗阻

21. 患者，女性，82 岁，反复咳嗽、咳痰 20 余年，活动后气急 10 年，双下肢浮肿两年。5 天前受凉后出现咳嗽、气急加重，下肢浮肿加重，伴有口唇紫绀，血气分析提示 pH7.23，PaCO₂80mmHg，PaO₂80mmHg 血常规：WBC9.3×10⁹/L，N78%，Hb165g/L。胸片提示肺气肿改变。请问该患者的首先治疗措施是（ E ）

- A. 呼吸兴奋剂改善呼吸衰 B. 大剂量利尿剂治疗改善心衰
C. 高浓度吸氧改善缺氧 D. 静滴碳酸氢钠改善酸中毒
E. 无创呼吸机通气支持治疗

22. 女，22 岁，2 年来反复痰中带血，间有大口咯血，体格检查无异常体征，X 线示左下肺纹理增粗，紊乱，最可能的诊断是（ B ）

- A. 风心二尖瓣狭窄 B. 支气管扩张症 C. 慢性支气管炎
D. 肺结核 E. 肺癌

23. 男性，38 岁，平素身体健康，饮酒后 4 小时出现上腹痛，14 小时后出现呼吸困难，40 次/分，最恰当的诊断是（ E ）

- A. 急性胃炎 B. 大叶性肺炎 C. 急性肠梗阻 D. 急性水肿型胰腺炎
E. 急性出血坏死性胰腺炎合并成人呼吸窘迫综合症

24 男性，45 岁，平时健康，因感冒急诊就诊，查血红蛋白 120g/L，白细胞 $30.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $300 \times 10^9/L$ ，白细胞分类可见中晚幼粒细胞，中性粒细胞碱性磷酸酶活性显著减低。以下体征哪一项对此病最有特异性（ A ）

- A. 巨脾 B. 全身浅表淋巴结肿大 C. 牙龈肿胀 D. 皮肤紫癜
E. 胸骨压痛

25. 男性患者，62 岁，大量饮酒史 25 年，日饮白酒约半斤，近 5 年来反复出现上腹部隐痛，伴有右肩背部放射痛，每日大便 3~4 次，为糊样便，无粘液脓血。查体：巩膜轻度黄染，腹平软，右上腹部轻压痛，无反跳痛及肌紧张，医学影像学提示胆囊壁增厚，化验血清淀粉酶 520U（Somogy 法），尿淀粉酶 400U（Winslow 法），为进一步明

确诊断最有帮助的检查是（ E ）

- A. 血脂肪酶 B. 结肠镜 C. 大便细菌培养 D. 大便常规检查
E. 胰腺增强 CT

26. 某慢性肝炎患者，突然呕血 200ml，暗红色。查体：巩膜轻度黄染，肝掌，蜘蛛痣，肝肋下未及，脾肋下 3cm 少量腹水。首选的治疗方法是（ D ）

- A. 静脉注射维生素 K B. 静脉注射白蛋白 C. 静脉滴注甲氰米胍
D. 口服氢氧化铝凝胶 E. 静脉滴注垂体后叶素

27. 男，54 岁，面色晦暗，双下肢瘀斑，乳房发育 1 年余。血常规：WBC $1.0 \times 10^9/L$ ，Hb90g/L，血小板计数 $54 \times 10^9/L$ ，ALT:54U，A/G:1/9，PT:24 秒，毛细血管脆性增加，网织红细胞计数 1.054，患者最可能的诊断是（ D ）

- A. 再生障碍性贫血 B. 特发性血小板减少性紫癜 C. 过敏性紫癜
D. 肝硬化失代偿期 E. 急性白血病

28. 女，36 岁。反复胸闷、气短，经内科积极治疗无效。检查：双肺底散在湿罗音，心界向左下扩大，S1 减弱，P2 亢进，心尖可闻及舒张中晚期隆隆样杂音和 3/6 级收缩期吹风样杂音，心功能 III 级。此时最佳治疗措施是（ A ）

- A. 二尖瓣替换术 B. 抗心力衰竭药物治疗 C. 二尖瓣及肺动脉瓣替换术
D. 二尖瓣直视分离术 E. 二尖瓣闭式分离术

29. 男性，50 岁。反复咳嗽、咳痰 4 年，近半年来发作时常伴呼吸困难。查体：双肺散在哮鸣音，肺底部有湿罗音。肺功能测定：1 秒钟用

力呼气容积/用力肺活量为 55%，残气容积/总量为 35%。诊断应考虑为（ B ）

- A. 慢性单纯型支气管炎 B. 慢性喘息型支气管炎 C. 支气管哮喘
D. 慢性支气管炎合并肺气肿 E. 支气管哮喘合并肺气肿

30. 女性，21 岁，幼年起反复喘息发作，近一年来发作频繁，夜间重，双肺散在呼气性哮鸣音，心音正常。心率 110 次/分，呼吸频率 32 次/分，胸片未见明显异常，WBC $11\times 10^9/L$ ，嗜酸性粒细胞 7%。诊断支气管哮喘最主要的临床依据是（ D ）

- A. 呼吸频率加快 B. 喘息发作以夜间为主 C. 胸片
D. 喘息发作时双肺呼气性哮鸣音 E. 血常规提示白细胞增加，嗜酸性粒细胞增加

31. 男性，50 岁，饮酒后上腹痛，腹胀 8 小时。查体：血压 130/80mmHg，呼吸 18 次/分，上腹明显压痛，肌紧张，反跳痛，血淀粉酶 >500 单位，下列哪项措施不合适（ D ）

- A. 禁食 B. 胃肠减压 C. 应用质子泵抑制剂静脉滴注
D. 及早应用肾上腺糖皮质激素 E. 及早应用奥曲肽静脉滴注

32. 男性，28 岁，12 岁起每年春秋季节反复出现喘息发作，咳嗽，吸入沙丁胺醇有效，五天前闻油烟后再次出现发作性喘息症状。查体：大汗淋漓，发绀脉搏细速，心率 120 次/分，BP:160/100mmhg，T37.6℃，双肺闻及散在哮鸣音，血气：PaCO₂50mmhg, PaO₂50mmhg，WBC:

$10.1\times 10^9/L$ 。判定该病人病情严重的最主要指标是（ D ）

- A. 双肺哮鸣音 B. 血压升高 C. 体温升高 D. 血气分析提示 PaCO₂

升高 E. 白细胞数升高

33. 女性，25 岁。心悸、气促 10 年，反复咯血，查体：心尖部第一心音亢进，可闻及开瓣音及舒张期隆隆样杂音，肺动脉瓣区第二心音亢进，X 线示梨形心，宜采用下列哪种方式治疗（ C ）

A. 洋地黄 B. 利尿剂 C. 二尖瓣分离术 D. 二尖瓣置换术 E. 垂体后叶素止血

34. 女性，25 岁。劳力性心悸、气短 2 年，查体：第一心音亢进，无第三心音，心尖部出现舒张期隆隆样杂音，胸部 X 线透视心缘部膨隆，此病人诊断为（ B ）

A. 二尖瓣狭窄并关闭不全 B. 单纯二尖瓣狭窄 C. 主动脉瓣关闭不全 D. 二尖瓣狭窄合并亚急性细菌性心内膜炎 E. 主动脉瓣狭窄

35. 患者女性，68 岁，有慢性咳嗽史 15 年，感冒后易出现病情加重，夜间咳嗽重，痰量多。查体：神志清，唇甲轻度紫绀，桶状胸，双肺叩诊过清音，双肺呼吸音低，动脉血气分析结果： PaO_2 10kPa (75mmHg), PaCO_2 6kPa [45mmHg], 经治疗后病情缓解，但活动后或夜间易出现低氧血症，此病人在家休息时最应采取的治疗是（ D ）

A. 作腹式呼吸、加强膈肌运动 B. 避免吸入有害气体 C. 保持室内清洁无尘 D. 长期家庭氧疗 E. 作定量行走锻炼、改善肺功能

36. 一心房颤动病人，突发呼吸困难、咳嗽、胸痛，X 线检查右肺下三角形浸润阴影，心脏听诊闻及三尖瓣区舒张期奔马律，其来源为(D)

A. 左房奔马律 B. 右房奔马律 C. 左室奔马律 D. 右室奔

马律 E. C+D 重叠奔马律

37. 患者，男，45 岁。发现黄疸 1 个月，呈进行性加重，持续性右上腹痛，消瘦明显，应首先考虑的是（ C ）

A. 急性病毒性肝炎 B. 肝硬化 C. 肝癌 D. 胆囊炎 E. 胆石症

38. 女性，30 岁，腰痛、尿频、尿急、血压：21.3/13.3kPa(160/100mmHg)，尿蛋白(+)，沉渣红细胞 8~10/HP，白细胞 15~20/HP。肾盂造影示又肾缩小，肾盏扩张，最可能的诊断是（ B ）

A. 慢性肾炎 B. 慢性肾盂肾炎 C. 多囊肾 D. 肾结核
E. 肾盂积液

39. 一慢性肺心病病人，经抗炎平喘治疗，感染控制，但仍浮肿，应用利尿剂后仍不消退，应考虑使用哪项处理（ E ）

A. 调换抗生素 B. 提高吸氧浓度 C. 加用呼吸兴奋剂
D. 控制入水量 E. 小剂量应用强心剂

40. 男性，65 岁，突然剧烈头痛伴呕吐。查体：颈项强直，克氏征(+)，巴氏征(+)。CT 示双侧裂池及纵裂池内高密度影。首先应考虑（ C ）

A. 脑炎 B. 脑膜炎 C. 蛛网膜下腔出血 D. 脑肿瘤 E. 脑脓肿

41. 患者女性，33 岁。劳累后心悸气促 7 年，检查：二尖瓣面容，第一心音亢进，心尖部可闻及 III 级隆隆样舒张期杂音，有开瓣音，P2>A2，心律规则，本次因为气促不能平卧伴咯血入院。下列最合适的治疗方法是（ A ）

A. 速尿静脉注射 B. 镇咳剂 C. 止血剂 D. 西地兰静脉注射
E. 吸氧

42. 一风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴快速房颤患者，地高辛 0.25mg/d。

治疗 1 个月后出现哪种情况需立即停用洋地黄类药物（ E ）

- A. 胸骨左缘 3~4 肋间出现舒张期隆隆样杂音 B. 肺动脉瓣区舒张期吹风样杂音增强
C. 夜间尿量增多 D. 心电图示 ST 段呈鱼钩样斜行下移
E. 心率 60 次/分，节律规整

43. 男性，18 岁，农民，夏天在河塘游泳后出现稽留高热 4 天，伴畏寒发热，头痛，身痛乏力。体检：体温 39.8℃，巩膜及皮肤黄染，结膜充血，皮肤可见出血点，肝肋下 1cm，脾肋下刚触及，腹股沟淋巴结如蚕豆大 4 个。血象：WBC： $10.5 \times 10^9/L$ ，N:80%，肝功能：ALT:280U/L，血清总胆红素:110 $\mu\text{mol/L}$ ，尿胆红素（+），尿中可见 WBC3-5/HP，诊断最可能为（ C ）

- A. 急性黄疸型肝炎 B. 流行性出血热 C. 钩端螺旋体病
D. 伤寒 E. 疟疾

44. 男性，46 岁，醉酒后出现高热、咳嗽。咳大量脓臭痰，X 线显示右下肺大片高密度影，内见气液平面，治疗首选的抗生素是（ C ）

- A. 丁胺卡那霉素 B. 红霉素 C. 青霉素 D. 头孢他啶
E. 氟哌酸

45. 男性，30 岁，夜尿多，乏力。查体：血压:120/100mmhg。血钠:142mmol/L，血钾:2mmol/L。血 pH:7.5，尿钾:350mmol/24 小时。诊断最可能的是（ C ）

- A. 高血压病 B. 嗜铬细胞瘤 C. 原发性醛固酮增多症
D. 皮质醇增多症 E. 肾动脉狭窄

46. 女，16 岁，近 3 天双下肢伸侧出现紫癜，分批出现两侧对称、颜色鲜红，伴腹痛及关节痛，血小板： $100 \times 10^9/L$ ，Hb： $110g/L$ ，凝血时间正常，应首先考虑（ B ）

- A. 特发性血小板减少性紫癜 B. 过敏性紫癜 C. 急性白血病
D. 再生障碍性贫血 E. 血友病

47. 男，50 岁，一天来寒战高热（ $39.6^{\circ}C$ ），咳嗽伴胸痛，咳痰呈砖红色胶冻样，量多，查体轻度发绀，BP： $80/50mmHg$ ，左肺叩浊，呼吸音低，X 线胸片左肺呈多发性蜂窝状阴影，最可能的诊断为（ E ）

- A. 肺炎球菌肺炎，休克型 B. 葡萄球菌肺炎 C. 厌氧菌肺炎
D. 军团菌肺炎 E. 克雷伯杆菌肺炎

48. 男性，25 岁，一周前右足底被铁钉刺伤，未做清创处理。近日感头痛、咬肌紧张酸胀，诊断为破伤风，其发病机制中错误的是（ A ）

- A. 破伤风杆菌产生的内毒素引起症状 B. 痉挛毒素是引起症状的主要毒素
C. 溶血毒素引起组织局部坏死和心肌损害 D. 破伤风是一种毒血症
E. 毒素也可影响交感神经

49. 患者女性，45 岁，2 年来常突然头痛，头晕，出汗，呼吸困难，发作时血压 $200/120mmHg$ ，均于 2 小时后症状自行消失，血压恢复正常，最可能的诊断是（ B ）

- A. 高血压危象 B. 嗜铬细胞瘤 C. 肾动脉狭窄 D. 皮质醇增多症
E. 高血压病

50. 女性，55 岁。高血压 20 年，不规则服药。某日晨突发头痛，意识不清，30 分钟后送到医院。体检：昏迷，血压： $28/16kPa$ ，双眼向

右侧凝视，左足外旋位，最可能的诊断是（ B ）

- A. 晕厥 B. 脑出血 C. 脑血栓形成 D. 蛛网膜下腔脑出血
E. 心肌梗死

三、A3/ A4 型题 共 50 题（病例组型最佳选择题：试题结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景，然后提出 2 个～3 个相关问题，每个问题均与开始的临床情景有关，但测试要点不同，且问题之间相互独立）。

（1-2 题共用题干）

患者，女，23 岁。因路人发现晕倒在地而送来急诊，体检：神志恍惚，瞳孔缩小，呼出气无特殊气味，心率 120 次/分，律齐，BP:90/60mmHg, 上臂可见多处注射针眼

1. 该患者最有可能的诊断是（ B ）

- A、有机磷中毒 B、鸦片类中毒 C、乙醇中毒
D、口服地西洋中毒 E、以上都不是

2. 对于中毒所致昏迷患者，用纳洛酮解毒的常用剂量是（ B ）

- A、0.2—0.4mg 肌注或静点 B、0.4—2mg 肌注或静点
C、2mg 肌注或静点 D、2—3.0mg 肌注或静点
E、2—4mg 肌注或静点

（3—4 题共用题干）

患者，女，58 岁，反复胸痛收入 ICU，拟“冠心病，心绞痛”，给予静脉滴注硝酸甘油，2h 后突然发生剧烈胸痛，伴呕吐，体检：患者

无反应，脉搏测不出，心电监护示室颤。

3、下列那一项是最有可能的诊断（ C ）

- A、心肌梗死 B、心源性休克 C、心脏骤停
D、充血性心衰 E、心绞痛

4、下列那一项是最佳的抢救措施（ C ）

- A、气管插管辅助通气 B、同步双向波电复律 100J
C、非同步双向波电除颤 200J D、静脉注射利多卡因
E、静脉注射肾上腺素 1mg

（5—7 题共用题干）

男性，71 岁吸烟患者。反复咳嗽、咳痰、气促 40 余年，胸闷、心悸 2 年，加重伴发热 1 周，昏睡 3 小时入院。入院后查体 BP：140/90mmHg，嗜睡状，呼之能应，瞳孔等大等圆，对光反射存在，口唇发绀，双肺可闻及干、湿啰音，心率 120/分，早搏 3/分下肢凹陷性水肿。

5. 该患者最可能的诊断是（ B ）

- A. 冠状动脉硬化性心脏病 B. 慢性肺源性心脏病
C. 风湿性心脏病 D. 原发性心脏病 E. 高血压心脏病

6. 假设上述诊断成立，补充体检时还可出现的最重要体征是（ D ）

- A. 心音强弱快慢不等 B. 心界向左下扩大
C. 心界向左、右两侧扩大 D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
E. 心尖区可闻及 3/6 级粗糙吹风样全收缩期杂音

7 假设上述诊断成立，其出现昏睡最可能的原因是（ C ）

- A. 代谢性碱中毒 B. 中毒性脑病 C. 肺性脑病

D. 脑梗赛 E. 脑出血

(8-11 题共用题干)

男性矿工，井下作业时发生塌方砸伤背部，当即倒于地上，下肢无力不能行走，立即来诊。检查见胸腰段后凸畸形并压痛，双下肢不全瘫，感觉异常平面位于双侧腹股沟水平。

8、为明确诊断应首选的辅助检查是 (B)

A. 肌电图 B. X 线片 C. CT D. MRI E. B 超

9、正确的搬运方法 (D)

A. 一人用一手抱颈另手抱腿放于担架上

B. 一人抬头，另人抬足放于木板上

C. 两人架其上肢助其走上担架车

D. 两人将其躯干成一整体滚动至木板上

E. 三人分别抬其头和两腿放于担架上

10、如果伤后 3 个小时，病人双下肢感觉、运动逐渐恢复，其最可能是 (C)

A. 脊髓水肿 B. 脊髓出血 C. 脊髓震荡

D. 脊髓挫伤 E. 脊髓受压

11、如果伤后病人腹胀、腹痛、大便秘结，可能是由于 (E)

A. 肾脏损伤 B. 直肠损伤 C. 膀胱损伤

D. 尿道损伤 E. 腹膜后血肿刺激

(12-13 题共用题干)

患者，男，20 岁。检修电机时，突然晕厥，大动脉搏动消失，无自

主呼吸等自主活动，ECG 示：“室颤”

12、需立即采取的最有效的措施是（ A ）

- A. 电击除颤 B. 机械通气 C. 连续心前锤击
D. 口对口人工呼吸 E. 胸外心脏按压

13、自主循环恢复后，为维持动脉压，最有效的常用药（ A ）

- A. 多巴胺 B. 多巴酚丁胺 C. 硝酸甘油
D. 阿托品 E. 异丙肾上腺素

（14-16 题共用题干）

男性，14 岁，晨跑后突感左胸闷、胀痛，气促出冷汗。查体：神志清楚，面色苍白，唇发绀，呼吸 26 次/分，左上肺叩诊呈鼓音，呼吸音消失，心率 110 次/分。

14、最可能的诊断是（ D ）

- A. 心绞痛 B. 胸膜炎 C. 带状疱疹
D. 自发性气胸 E. 肋间神经痛

15、为明确诊断最佳检查应选择（ B ）

- A. 肺功能 B. 胸片 C. 胸部 B 超
D. 胸部 CT E. 核磁共振

16、为缓解患者上述症状，最佳紧急处理为（ D ）

- A. 氧疗 B. 抗生素治疗 C. 给与镇静剂治疗
D. 抽气减压 E. 给予强心剂

（17-20 题共用题干）

男，25 岁，突发昏迷入院。其口唇樱桃红，血压 110/70mmHg，心率

80 次/分，诊断为一氧化碳中毒。

17、主要中毒机制为（ C ）

- A. 呼吸抑制 B. 血红蛋白病 C. 生成 COHb
D. CO₂ 增加 E. 以上都不是

18、CO 中毒，血清中碳氧血红蛋白水平为（ C ）

- A. 10%—20% B. 5%—10% C. 30%—50%
D. 50%—60% E. 60%—70%

19、高压氧治疗 CO 中毒，氧舱压力通常为（ B ）

- A. 1—2 B. 2—3 C. 3 D. 4 E. 3—4

20、一氧化碳中毒患者在意识恢复后，经过多少天的“假愈期”可出现迟发性脑病（ C ）

- A. 1—7d B. 2—30d C. 2—66d
D. 7—30d E. 30—60d

（21-22 题共用题干）

患者，女，63 岁。胸痛 1 小时后，突然昏倒，神志不清，血压测不出，心音消失，瞳孔散大，面色苍白，大动脉搏动消失，ECG 示：室性自主节律，拟诊为心脏骤停。

21、由两人同时进行心肺复苏时，推荐用口对口人工呼吸和胸外按压的比例是（ A ）

- A. 2:30 B. 1:5 C. 2:10 D. 1:4 E. 2:8

22、成人胸外心脏按压有效的标志是（ E ）

- A. 收缩压 > 60mmHg B. 舒张压 > 60mmHg

C. 平均动脉压 $>80\text{mmHg}$ D. 收缩压 $>80\text{mmHg}$

E. 可触摸到颈动脉搏动

(23-25 题共用题干)

男, 36 岁, 误服甲胺磷 20ml, 昏迷 2 小时入院。当洗胃至 1500ml 时, 抽出液为血性, 故停止洗胃, 同时用阿托品静脉注射、解磷定静脉滴注, 治疗 10 小时神志转清, 继续维持治疗至症状完全消失。第 3 天起阿托品改为口服, 停用解磷定。当晚突发气促, 心悸、出汗、留涎, 双肺底散在湿性罗音, 心率 72 次/分, 律齐。

23、第 3 天晚上出现的病情应首先考虑为 (B)

A. ARDS B. 甲胺磷中毒反跳 C. 低血糖症

D. 支气管哮喘 E. 急性左心衰竭

24、导致第 3 天晚病情变化的主要原因是 (B)

A. 服毒量过大 B. 洗胃不彻底, 毒物未被彻底清除

C. 输液量过多过快 D. 减量过早

E. 甲胺磷在肝脏解毒后毒性增强

25、上述病例进一步抢救措施最重要的是 (E)

A. 哌替啶肌内注射 B. 氨茶碱静脉注射

C. 给氧 D. 毛花苷丙静脉注射

E. 改阿托品为静脉注射, 加用解磷定静脉滴注

(26-27 题共用题干)

患者, 男, 30 岁。海边游泳时不慎溺水, 被人救起, 体检: 呼吸急促, 肺部可闻及哮鸣音和湿罗音, HR:100 次/分, 偶闻早搏 2—3 次/

分，腹部膨隆，四肢厥冷，拟近乎“淹溺”。

26、海水淹溺时，下列那一项一般不会发生（ B ）

- A. 心律失常 B. 溶血 C. 低氧血症
D. 肺水肿 E. 脑水肿

27、进入 ICU 1—2d，最常见危及生命的严重并发症（ B ）

- A. 高钠血症 B. ARDS C. 频发室性早搏
D. 消化道出血 E. 酸中毒

（28-29 题共用题干）

男性，40 岁，建筑架子工人，进食炒鸡蛋和烙饼 6 两，3 小时后干活中出现腹痛，渐加重，以后 24 小时来停止排气排便，未呕吐，无发热，疼痛性质为阵发性绞痛。

28、当病人就诊时，选择哪项检查，最能提供可靠诊断线索（ D ）

- A. 胸透 B. 腹部片 C. 查 WBC
D. 立位腹平片 E. 直肠指诊

29、查体时可见左下腹固定肠型，可触及一长约 15cm 的肠袢，体温正常，HR:102 次/分，BP:110/70mmHg, 移动性浊音（±），肠鸣音极弱。可能的诊断是（ E ）

- A. 胰腺炎 B. 急性胃肠炎 C. 克罗恩病
D. 粪块堵塞性肠梗阻 E. 肠扭转

（30-31 题共用题干）

男性，60 岁，下台阶时不慎摔伤右髋部，入院查体：右髋部叩痛，内收，外旋 50° 畸形。

30、最可能诊断为（ D ）

- A. 右髌后脱位 B. 右髌前脱位 C. 右股骨头骨折
D. 右股骨颈骨折 E. 右股骨转子间骨折

31、证实诊断首先需要的检查为（ A ）

- A. 普通 X 线片 B. CT 检查 C. MRI 检查
D. 核素骨扫描 E. 关节腔造影

（32-36 题共用题干）

患者，女性，65 岁，因阵发性胸闷 8 年，持续胸痛 8 小时收入院。

入院时血压为 150/90mmHg，诊断急性前间壁心肌梗死。

32、支持诊断的心电图改变为（ C ）

- A. II、III、aVF 出现异常 Q 波，伴 ST 段弓背向上抬高
B. V1~V4 出现异常 Q 波，伴 ST 段弓背向上抬高
C. V1~V3 出现异常 Q 波，伴 ST 段弓背向上抬高
D. 频发室性早搏 E. 三度房室传导阻滞

33、此时最具特征性的实验室改变是（ D ）

- A. 血清 LDH 上升 B. 血清 GOT 上升 C. 血清 GPT 上升
D. 血清 CK-MB 上升 E. 血清肌红蛋白下降

34、上述患者出现频发室性早搏，伴短阵室性心动过速，此时最恰当的处理是（ C ）

- A. 静推西地兰 B. 同步电复律 C. 静脉注射利多卡因
D. 口服普鲁卡因胺 E. 口服妥卡尼

35、住院第 2 日患者出现胸闷、大汗、面色苍白，体检心率 126 次/

分，律齐，双肺未闻及干湿性啰音，血压 90/60mmHg，考虑合并心源性休克。此时不宜使用（ B ）

- A. 主动脉内气囊反搏术 B. 静注速尿 C. 静滴多巴胺
D. 静滴多巴酚丁胺 E. 皮下注射低分子肝素

36、起病 4 周后，病人反复低热，左肺底有湿性啰音，心前区闻及心包摩擦音，此时应考虑并发（ D ）

- A. 肺结核 B. 尿毒症 C. 感染性心内膜炎
D. 心肌梗死后综合征 E. 肺栓塞

（37-38 题共用题干）

男性，45 岁，1 个月来反复发生夜间呼吸困难，加重 1 天来诊。查体：心率：140 次/分。BP:180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音。

37、此患者最需鉴别的是（ C ）

- A. 慢性支气管炎还是急性支气管炎 B. 肺心病还是 ARDS
C. 心源性哮喘还是支气管哮喘 D. 肺部良性肿瘤还是恶性肿瘤
E. 双侧肺炎还是左心衰竭

38、如无法在短时间内做出鉴别又急需尽快缓解其呼吸困难可选用（ B ）

- A. 吗啡 B. 氨茶碱 C. 泼尼松
D. 必嗽平 E. 复方甘草片

（39-43 题共用题干）

男性，62 岁，慢性咳嗽、咳痰 10 余年，每年持续 3~4 个月，以冬

季为重，近 2~3 年出现活动后气短，偶有双下肢浮肿，今日晨起突感左上胸针刺痛，似与呼吸有关，继之出现呼吸困难，大汗，不能平卧，随来急诊就诊。

39、询问病史的重点就是（ A ）

- A. 胸痛的部位、性质及伴随症状 B. 冠心病、心绞痛病史
- C. 吸烟史 D. 近期心电图检查情况
- E. 近期胸部 X 线检查情况

40、体检重点应是（ C ）

- A. 肺下界位置及肺下界移动度 B. 肺部啰音
- C. 胸部叩诊音及呼吸音双侧对比 D. 心脏听诊
- E. 胸膜摩擦音

41、以下检查中最有价值的是（ C ）

- A. 血 WBC 计数及分类 B. 心电图检查 C. 胸部 X 线检查
- D. 血气分析 E. B 型超声显像

42、若查体气管右移，左肺呼吸音消失，胸片示肋间隙增宽，右肺透亮度增加，左肺压缩 50%，外带肺纹理消失，最有效地治疗措施是（ D ）

- A. 面罩吸氧 B. 机械通气 C. 加用抗生素预防感染
- D. 胸腔插管水封瓶引流 E. 加用支气管扩张剂，缓解气道痉挛

43、若治疗过程中，患者呼吸困难改善不明显，渐出现神志恍惚，烦躁，血气分析示：pH:7.29, PaO₂:56 mmHg, PaCO₂:74mmHg，吸氧应采取的方式是（ E ）

- A. 面罩吸氧 B. 持续高浓度，大流量吸氧 C. 纯氧吸入
D. 间断高浓度，大流量吸氧 E. 持续低流量吸氧

（44-46 题共用题干）

患者青年男性，被刀刺伤，急诊入院被诊为开放性气胸。

44、最有意义的体征是（ A ）

- A. 听到空气出入胸膜腔的响声 B. 气管移位
C. 呼吸音减弱 D. 伤侧叩呈鼓音 E. 心音遥远，血压下降

45、现场急救（ B ）

- A. 胸穿 B. 加压封闭伤口 C. 清创
D. 输液，输血 E. 给氧，送医院

46、送入医院后，首先应处理的是（ E ）

- A. 纠正休克 B. 清创缝合 C. 闭式引流
D. 开胸探查 E. 转为闭合性气胸

（47-50 题共用题干）

男性，52 岁，十二指肠溃疡病史 10 年，几乎每年发作一次，自觉今年格外重，今日晨起突然腹痛难忍，呈刀割样，上腹开始，很快扩散至全腹，来诊，见患者面色苍白，冷汗，肢体发凉，BP:14 / 12kPa，脉搏 90 次分，查体时病人表情痛苦，不敢深呼吸，全腹压痛，反跳痛，肌紧张明显。

47、考虑该患者是（ C ）

- A. 急性胰腺炎 B. 急性阑尾炎
C. 胃十二指肠溃疡急性穿孔 D. 急性化脓性梗阻性胆管炎

E. 急性胆囊炎

48、为确诊，宜做下列哪项检查（ A ）

- A. 立位腹平片 B. 血常规检查 C. 血清淀粉酶测定
D. B 超检查 E. 肛门直诊

49、患者如拍立位腹平片，出现下述哪种征象，有助于前述诊断（ E ）

- A. 无明显异常听见
B. 左膈声高，胃受压右移，胃结肠间距增宽
C. 腰大肌阴影消失
D. 见多数液平面和气胀肠袢
E. 膈下见半月形的游离气体影

50、宜如何处理（ E ）

- A. 半卧位休息 B. 胃肠减压 C. 输液
D. 全身给抗生素 E. 以上各项均对

四、B 型题 共 100 题。（配伍选择题，先列出 5 个用英文字母标明的备选答案，接着是 2 道以上用数字标明的试题，要求从备选答案中为每道试题配 1 个最合适的答案）

（1—3 题共用备选答案）

- A 阿托品 B 冰帽 C 人工呼吸，胸外心脏按压 D 人工心脏起搏
E. 气管插管

1、确立心脏骤停后给予的最基本的生命支持方法是：（C）

2、建立人工通气的最好方法是：（E）

3、心脏复苏后出现严重心动过缓，最好的治疗方法是：(D)

(4—7 题共用备选答案)

A 颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性 B 心脏相对浊音界缩小
或叩不出 C 心尖搏动左下移位 D 肺动脉瓣区第二心音亢进
E 剑突下可见心脏搏动

4、提示慢性阻塞性肺气肿的体征：(B)

5、提示右心功能不全的体征：(A)

6、提示右心室肥大的体征：(E)

7、提示肺动脉高压的体征：(D)

(8-10 题共用备选答案)

A. 晶体液和糖液 B. 胶体液 C. 升压药 D. A、B 均可
E. A、B 均不对

8、烧伤休克补液时，血压低、尿量少要补充：(D)

9、烧伤休克补液时，血压不低、尿量少要补充：(A)

10、烧伤休克补液时，中心静脉压高、尿量少补充：(E)

(11-12 题共用备选答案)

A. 医患双方不是双向作用，而是医生对病人单相发生作用
B. 医患双方在医疗活动中都是主动的，医生有权威性，充当指
导者
C. 医生和病人具有近似同等的权利
D. 长期慢性病人已具有一定医学科学知识水平
E. 急性病人或虽病情较重但他们头脑是清醒的

11、指导合作型的特点(B)

12、主动被动型的特点(A)

(13-14 题共用备选答案)

A 高血压危象 B 高血压脑病 C 顽固性高血压 D 恶性高血压
E 老年高血压

13、舒张压持续 $\geq 130\text{mmHg}$, 伴头痛、眼底出血、乳头水肿等应是:

(D)

14、在短期内血压明显升高, 出现头痛、呕吐等症状是: (B)

(15-19 题共用备选答案)

A 脓血痰 B 铁锈色痰 C 粉红色泡沫样痰 D 砖红色胶冻样痰 E
脓臭痰

15、原发性肺脓肿: (E)

16、大叶性肺炎: (B)

17、金黄色葡萄球菌肺炎: (A)

18、克雷伯杆菌感染: (D)

19、左心衰竭肺水肿: (C)

(20-23 题共用备选答案)

A 病侧胸廓饱满, 呼吸运动减弱或消失, 语颤消失可见于

B 胸廓呈桶状, 两侧呼吸运动减弱, 语颤减弱可见于

C 病侧胸廓塌陷, 呼吸运动减弱, 语颤减弱可见于

D 胸廓对称, 两侧呼吸运动均等, 语颤正常可见于

E 胸廓对称, 病侧呼吸运动减弱, 语颤增强可见于

20、肺实变：(E)

21、肺气肿：(B)

22、气胸：(A)

23、阻塞性肺不张：(C)

(24-26 题共用备选答案)

A. 常发生在进油腻食物后 B. 暴饮暴食、饮酒后发生

C. 腹痛在剧烈运动后发生 D. 持续性腹痛阵发性加重

E. 转移性腹痛

24、急性胆囊炎发病与饮食的关系是：(A)

25、急性胰腺炎发病与饮食的关系是：(B)

26、胆石症合并胆道感染时腹痛为：(D)

(27-28 题共用备选答案)

A. 行政复议 B 行政诉讼 C. 行政赔偿诉讼 D. 民事诉讼

E. 刑事诉讼

27、执业医师对被注销注册有异议的，可以依法采取的司法救济途径是(A)

28、医疗机构因违法实施疫情控制措施，侵犯就医人合法权益的，受害人可以依法采取的有效救济途径是(B)

(29-33 题共用备选答案)

A. 动脉导管未闭 B. 室间隔缺损 C. 肺动脉狭窄 D. 房间隔缺损 E. 弗洛四联症

29、胸骨左缘 2-3 肋间连续性机械样杂音：(A)

30、胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，伴有震颤，肺动脉第二音亢进：（ B ）

31、胸骨左缘 2-3 肋间吹风样收缩期杂音，伴肺动脉第二音亢进分裂：（ D ）

32、胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，P2 减弱：（ C ）

33、属于发绀性先天性心脏病的是：（ E ）

(34-37 题共用备选答案)

- A. 伤后出现红斑，轻度肿胀，痛觉明显
- B. 创面表皮去除后基底呈苍白色，皮革样改变，毛发易拔除
- C. 创面基底粉白，水肿明显，伴有少量渗出，愈合后遗留程度不同的瘢痕
- D. 伤后创面基底红润、剧痛，2 周左右愈合，愈合后不留疤痕
- E. 创面基底时有小出血点，干燥后可见毛细血管网，创面温度略下降，常采用植皮术

34、I 度烧伤：（ A ）

35、浅 II 度烧伤：（ D ）

36、深 II 度烧伤：（ C ）

37、III 度烧伤：（ B ）

(38-41 题共用备选答案)

- A. 突然上腹部持续性刀割样疼痛，查体为板状腹
- B. 突然上腹部阵发性钻顶样剧痛，间歇期无痛
- C. 突然上腹部绞痛，持续性腹痛伴阵发性加剧，向右肩部放射

- D. 突然上腹部持续性剧烈疼痛，腰背部痛
- E. 突然一侧腹痛阵发性绞痛，放射至外阴部

38、胆囊管结石嵌顿：（ C ）

39、溃疡病穿孔：（A）

40、胆道蛔虫症：（ B ）

41、急性出血坏死型胰腺炎：（ D ）

（42-43 题共用备选答案）

A. 5ml B. 10ml C. 50ml D. 200ml E. 400ml

42、大便潜血阳性，消化道出血至少达：（ A ）

43、出现柏油样大便，消化道出血至少达：（ C ）

（44-45 题共用备选答案）

- A. 医生检查病人时，由于消毒观念不强，造成交叉感染
- B. 医生满足病人的一切保密要求
- C. 妊娠危急母亲的生命时，医生给予引产
- D. 医生对病人的呼叫或提问给予应答
- E. 医生的行为使某个病人受益，但却损害了别的病人的利益

44. 上述各项中属于医生违背不伤害原则的是（ A ）

45. 上述各项中属于医生违背有利原则的是（ E ）

（46-47 题共用备选答案）

- A. BP:80 / 50mmHg, CVP:3cmH₂O, 四肢皮肤花斑、湿冷
- B. BP:80 / 50mmHg, CVP:20cmH₂O, 颈静脉怒张
- C. BP:80 / 50mmHg, CVP:4cmH₂O, CO>10L / min, 四肢温暖

D. BP:160 / 100mmHg, CVP:16cmH₂O, 血性泡沫痰

E. BP:160 / 80mmHg, CVP:6cmH₂O, X 线胸片心影呈靴形

46、低血容量性休克: (A)

47、急性右心衰: (B)

(48-50 题共用备选答案)

A. 急性胆囊炎 B. 胰岛细胞瘤 C. 急性胰腺炎 D. 急

性化脓性胆管炎 E. 胰头癌

48、Charcot 三联征可见于: (D)

49、无痛性黄疸可见于: (E)

50、Whipple 三联征可见于: (B)

(51-53 题共用备选答案)

A. 桡骨下段骨折 B. 股骨颈骨折 C. 肱骨髁上骨折 D. 肋

骨骨折 E. 颈椎骨折

51、最容易导致骨缺血坏死的是: (B)

52、最容易形成手餐叉样畸形的是: (A)

53、最容易引起骨筋膜室综合征的是: (C)

(54-56 题共用备选答案)

A. 爪形手畸形 B. 垂腕手畸形 C. 猿手畸形 D. 内翻

垂足畸形 E. 仰趾畸形

54、腓总神经损伤: (D)

55、尺神经损伤: (A)

56、正中神经损伤: (C)

(57-58 题共用备选答案)

- A. 实施隔离措施 B. 停工、停业、停课 C. 宣布为疫区
D. 实施封锁 E. 对出入疫区的人员、物资和交通工具实施卫生检疫

57、对已经发生甲类传染病病例的场所，所在地县级以上地方人民政府可：（ A ）

58、对本行政区域内的甲类传染病疫区，省级人民政府可：（ D ）

(59-60 题共用备选答案)

- A. 骨筋膜室综合征 B. 肾挫伤 C. 脂肪栓塞 D. 失血性休克
E. 损伤性骨化

59、闭合性骨盆骨折可引起：（ D ）

60、闭合性成人股骨干骨折可引起：（ C ）

(61-62 题共用备选答案)

- A. 内囊区 B. 大脑前动脉 C. 大脑中动脉 D. 大脑动脉环 E. 颅内颈内动脉虹吸段

61、脑出血的主要发病部位是：（ A ）

62、颅内动脉瘤的主要发病部位是：（ D ）

(63-65 题共用备选答案)

- A. 肩关节后脱位 B. 肩关节前脱位 C. 桡骨小头半脱位
D. 髋关节后脱位 E. 指间关节脱位

63、临床上常见且易合并撕脱骨折的是：（ B ）

64、复位后不需要固定的是：（ C ）

65、最少见的脱位是：(E)

(66-67 题共用备选答案)

- A. 中心静脉压很低，尿量多 B. 中心静脉压偏低，尿量少
C. 中心静脉压偏高，尿量少 D. 中心静脉压偏高，尿量多
E. 中心静脉压很高，尿量少

66、血容量不足时表现为：(B)

67、液体量充足表现为：(D)

(68-71 题共用备选答案)

- A. 室间隔缺损 B. 法洛四联征 C. 房间隔缺损 D. 动脉导管未闭
E. 房室共同通道

68、周围血管征：(D)

69、缺氧性晕厥、抽搐：(B)

70、动脉血氧饱和度下降，血红蛋白、红细胞增加：(B)

71、心电图示右束支阻滞：(C)

(72-73 题共用备选答案)

- A. 脑血管疾病 B. 肺性脑病 C. 中毒性脑病 D. 右心衰竭
E. 肾功能障碍

72、肺心病患者咳喘加重 1 周，昏迷 1 天，应首先考虑：(B)

73、肺心病患者，气急少尿 1 周，下肢浮肿明显，应首先考虑：
(D)

(74-75 题共用备选答案)

- A. 脉搏增快，呼吸加深加快 B. 脉搏变慢，血压下降 C.

脉搏增快，血压升高 D. 脉搏增快，呼吸减慢 E. 脉搏增快，血压下降

74、缺氧早期的主要表现：(A)

75、二氧化碳潴留的早期临床表现是：(C)

(76-78 题共用备选答案)

A. 保持呼吸道畅通 B. 呼吸系统支持 C. 循环系统支持
D. 输血 E. 吸氧

76、严重创伤急救的 ABC 中 A 是指：(A)

77、严重创伤急救的 ABC 中 C 是指：(C)

78、严重创伤急救的 ABC 中 B 是指：(B)

(79-82 题共用备选答案)

A 代谢性碱中毒 B 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒 C 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒 D 呼吸性酸中毒 E 呼吸性碱中毒

79、肺泡通气不足：(D)

80、在治疗慢性呼吸衰竭的过程中，机械通气应用不当，使二氧化碳排出过快， PaCO_2 降至 38mmHg：(E)

81、慢性肺源性心脏病，II 型呼吸衰竭时，大量使用利尿剂减轻水肿：(B)

82、急性呼吸窘迫综合征的早期：(E)

(83-86 题共用备选答案)

A 流行性脑脊髓膜炎 B 肾综合征出血热 C 细菌性痢疾
D 霍乱 E 莱姆病

83、以发热、肾脏损害和出血为主要临床表现：(B)

84、以剧烈腹泻、呕吐以及由此而致的脱水、循环衰竭为主要临床表现：(D)

85、以腹痛、腹泻、里急后重和黏液脓血便为主要临床表现：(C)

86、以发热、头痛、呕吐和脑膜刺激征为主要临床表现：(A)

(87-90 题共用备选答案)

A. 等渗性缺水 B. 低渗性缺水 C. 高渗性缺水 D. 急性水中毒 E. 慢性水中毒

87、患者主诉畏食、恶心、呕吐、乏力但不口渴，血钠、氯正常：(A)

88、患者主诉极度口渴、乏力、尿少，尿比重增高：(C)

89、患者主诉恶心、呕吐，软弱无力，视物模糊，站立性晕倒。查尿中几乎不含钠：(B)

90、患者主诉软弱无力，恶心、呕吐，体重明显增加，皮肤苍白湿润：(E)

(91-93 题共用备选答案)

A 主动脉夹层 B 急性心肌梗死 C 肺动脉栓塞 D 输尿管结石 E 肠系膜动脉栓塞

91、患者男性，72 岁，有高血压病史 20 余年，晚餐后突发胸骨后压榨样疼痛 2 小时，向左肩背部放射，伴大汗淋漓，面色苍白：(B)

92、患者女性，45 岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄 15 年，伴心房颤动 1 年余，患者在做家务时突然发生下腹部剧烈绞痛：(E)

93、患者女性，56 岁，既往健康，否认冠心病，患者在 3 小时前因劳累后突然出现剧烈胸痛，向背部放射，伴左肢体瘫痪，急诊血压为 200 / 100mmHg：(A)

(94-97 题共用备选答案)

A 发热，咳嗽，咳大量脓痰，间断咳血 B 急起咽痛、流涕、鼻塞、发热 C 急起畏寒、发热、咳嗽、胸痛 D 缓起低热、乏力、盗汗、食欲减退、干咳、体重下降 E 突起胸痛、气促、咳嗽

94、肺炎：(C)

95、气胸：(E)

96、肺结核：(D)

97、支气管扩张：(A)

(98-100 题共用备选答案)

A. 晶体液和糖液 B. 胶体液 C. 升压药 D. A、B 均可
E. A、B 均不对

98、烧伤休克补液时，血压低、尿量少要补充：(D)

99、烧伤休克补液时，血压不低、尿量少要补充：(A)

100、烧伤休克补液时，中心静脉压高、尿量少补充：(E)

五、X 型题 共 200 题。(即任意选择题，可以有一个最佳答案，也可以有多个正确答案)

1、以下疾病常有晕厥发作并可能猝死：(BD)

A. 预激综合征 B. 肥厚型心肌病 C. 室间隔缺损 D. 主动脉

瓣狭窄 E. 以上均不正确

2、腓总神经损伤的主要表现有：(ABC)

A. 足部伸肌瘫痪 B. 腓骨长肌瘫痪 C 腓骨短肌瘫痪 D. 腓肠肌瘫痪 E. 以上均不正确

3、下列疾病常用的洗胃液哪些是正确的：(AC)

A. 原因不明急性中毒用温水洗胃
B. 有机磷农药敌百虫中毒用碳酸氢钠溶液洗胃
C. 重金属中毒用茶水洗胃
D. 有机磷农药对硫磷(1605)中毒用高锰酸钾洗胃
E. 以上均不正确

4、引起腹痛的原因有：(ABCDE)

A. 腹部炎症 B. 肿瘤浸润 C. 脏器淤血 D. 肠寄生虫病
E. 手法欠妥

5、关于肾性高血压以下哪些是正确的：(ACDE)

A. 发病多急骤 B. 降压药物控制效果好 C. 无高血压家族史
D. 多数舒张压升高明显 E. 年龄小于 30 岁或大于 50 岁

6、下列哪些因素对颅内压增高有影响：(ABDE)

A. 年龄 B. 病变部位 C. 性别 D. 病变进展速度
E. 伴发脑水肿的程度

7、下列哪些临床可在扩张性心肌病出现 (ABCE)

A. 猝死 B. 动脉栓塞 C. 第四心音奔马律 D. 心脏破裂
E. 心律失常

8、烧伤病人早期监测项目包括：（ABCDE）

A. 精神状态 B. 尿量 C. 脉率 D. 血压 E. 肢端皮温

9、胸腰段椎体压缩性骨折常见的临床表现包括：（ABC）

A. 脊柱后突畸形 B. 局部疼痛及压痛 C. 功能障碍 D. 反常活动及骨擦音 E. 以上都对

10、过敏性休克首选肾上腺素，主要与其下述作用有关：（ABDE）

A. 兴奋心脏 β_1 受体，使心输出量增加
B. 兴奋支气管 β_2 受体，使支气管平滑肌松弛
C. 兴奋眼辐射肌 α 受体，使瞳孔开大
D. 兴奋血管 α 受体，使外周血管收缩，血压升高；使支气管粘膜血管收缩，降低毛细血管的通透性，利于消除支气管粘膜水肿，减少支气管分泌
E. 抑制肥大细胞释放过敏性物质

11、对晕动病所致呕吐有效的药物是：（ABDE）

A. 苯海拉明 B. 异丙嗪 C. 氯丙嗪 D. 东莨菪碱 E. 梅克洛嗪

12、内脏痛的特点（BE）

A. 定位精确 B. 有牵涉痛 C. 对牵拉烧伤敏感 D. 对炎症、切割敏感 E. 对缺血敏感

13、脑复苏疗法的目的正确的有：（BCD）

A. 增加脑细胞代谢率 B. 提高脑部能量供给
C. 促进脑循环再流通 D. 降低脑细胞代谢率 E. 减少脑部

能量供给

14、下列哪项叙述符合小儿急性阑尾炎的临床特点：（ BCD ）

- A. 有右下腹明显压痛和肌紧张的典型体征
- B. 病情发展快且较重，早期即出现高热，呕吐
- C. 穿孔率、并发症和死亡率较高
- D. 治疗原则是早期手术
- E. 自觉症状不明显

15、腹部闭合性损伤时，考虑有内脏损伤的依据是：（ ABCDE ）

- A. 呕血 B. 持续性剧烈绞痛及腹膜炎体征 C. 腹部出现移动性浊音或肝浊音界消失
- D. 早期出现休克 E. 便血或尿血

16、颅内压增高的主要后果是：（ ACD ）

- A. 脑疝 B. 脑血流量增加 C. 脑水肿 D. 脑组织缺血缺氧 E. 以上都对

17、脑震荡的主要临床表现不正确的是：（ BCE ）

- A. 一过性意识障碍 B. 生命体征紊乱 C. 神经系统阳性体征
- D. 逆行性遗忘 E. 休克

18、烧伤早期处理正确的是：（ ACE ）

- A. 烧伤后立即冷敷治疗 B. 碱烧伤后立即以中和剂清洗
- C. 烧伤后，创面以凡士林纱布覆盖转运
- D. 清创时，必须完全清除污物，包括陷入创面内的煤渣等
- E. 氢氟酸烧伤后，注射钙剂或是镁剂，局部封闭

19、关于电击伤，叙述正确的是：（ ADE ）

- A. 有“入口”和“出口” B. 通常“出口”损伤较重
C 补液量和一般烧伤相同 D. 应尽早清创，覆盖创面
E. 合并内脏、神经、血管损伤很常见

20、下列关于急性胰腺炎的描述哪些是正确的：（ ADE ）

- A. 腹痛是主要的临床症状
B. 经多次呕吐排空胃内容物后，腹痛可缓解
C. 血清淀粉酶测定值的高低与病变程度成正比
D. 可以有脐周青紫 E. 血清脂肪酶升高是有助于诊断的客观指标

21、关于颈椎病，下列说法正确的是：（ BCDE ）

- A. 交感型颈椎病最多见 B. 神经根型表现为手部麻木无力
C. 可有心动过速等交感神经表现 D. 骨赘压迫食管可引起吞咽困难
E. 严重者可导致截瘫

22、严重烧伤病人就诊时，应立即采取的急救措施（ ADE ）

- A. 立即开放静脉通道，进行液体复苏 B. 立即做脑部 CT 检查
C. 立即进行腹部 B 超 D. 立即给病人吸氧，保持呼吸道畅通
E. 立即进行心电监护

23、颅内压增高常见的病因是：（ BCD ）

- A. 脑萎缩 B. 颅内肿瘤 C. 脑寄生虫病 D. 颅脑损伤 E. 颅内动脉瘤

24、小脑幕切迹疝的典型表现为：（ ABCE ）

- A. 患侧瞳孔先缩小，继之散大 B. 病变对侧锥体束征 C. 昏迷
D. 病变同侧锥体束征 E. 生命体征变化

25、枕骨大孔疝的典型表现为：（ BCD ）

A. 双瞳孔不等大 B. 呼吸骤停 C. 颈项强直 D. 意识比瞳孔变化晚 E. 意识比瞳孔变化早

26、胸部损伤后发生休克的原因：（ ABCDE ）

A. 胸内大血管破裂出血 B. 纵隔受压 C. 刺激肺门、纵隔神经引起 D. 血心包 E 疼痛

27、重症哮喘发作可能出现：（ ABCDE ）

A. 意识障碍 B. 脉压差增大，常有奇脉 C. 纵隔气肿
D. 心电图肺性 P 波 E. 呼吸频率大于 30 次 / 分

28、休克代偿期的症状包括：（ AC ）

A. 尿量减少 B. 皮肤粘膜发绀 C. 血压正常或稍高
D. 昏迷 E. 浅表静脉塌陷

29、衡量心肺复苏有效的指标包括：（ ABDE ）

A. 摸到大动脉搏动 B. 口唇发绀减轻 C. 收缩压在 80mmHg 以上
D. 散大瞳孔开始缩小 E. 出现自主呼吸动作

30、门脉高压症合并食管静脉曲张易引起破裂出血的原因是：（ ABC ）

A. 食管静脉离门静脉主干和腔静脉近，压力差大
B. 食管静脉易被粗糙食物和胃酸腐蚀
C. 静脉曲张后，覆盖的黏膜变薄 D. 凝血机制改变 E 以上都不对

31、下肢骨折、脱位易损伤的神经有：（ AC ）

A. 髋关节后脱位可伤及坐骨神经 B. 股骨髁上骨折易伤及胫神经

C. 腓骨颈骨折可伤及腓总神经 D. 股骨干中 1 / 3 骨折可伤及坐骨神经 E. 以上都不对

32、关于 ARDS 的病理改变，哪项是正确的：（ ABDE ）

A. 肺广泛性充血水肿 B. 肺泡大量萎缩 C. 肺泡扩张
D. 肺泡有透明膜形成 E. 肺的重量明显增加

33、硬脑膜外血肿的典型发展过程包括：（ ABD ）

A. 原发性意识障碍 B. 中间清醒期 C. 去大脑强直期
D. 渐次加重的意识障碍 E. 颅内压增高期

34、有关突发公共卫生事件正确的叙述是：（ BCDE ）

A. 重大交通事故
B. 造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情
C. 群体性不明原因疾病
D. 重大食物和职业中毒
E. 严重影响公众健康的事件

35、突发事件应急工作的工作原则是：（ ABDE ）

A. 预防为主，常备不懈 B. 统一领导，分级负责
C. 精诚合作，不怕困苦 D. 反应及时，措施果断 E. 依靠科学，加强合作

36、以下哪些情况需要各级人民政府在接到报告 1 小时内上报国务院卫生行政主管部门：（ ABCD ）

A. 发生或可能发生传染病爆发、流行的
B. 发生或发现不明原因的群体性疾病

- C. 发生传染病菌种、毒种丢失
- D. 发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件
- E. 发生或者可能发生不可抗拒的自然灾害

37、根据突发公共事件的发生过程、性质和机理，突发公共卫生事件分为哪几类：（ ABCE ）

- A 自然灾害 B 事故灾害 C. 公共卫生事件 D. 群众集体事件
- E. 社会安全事件

38、急性胸痛伴低血压休克应考虑 （ ABCDE ）

- A. 急性心肌梗塞 B. 急性肺梗塞 C. 主动脉夹层动脉瘤破裂
- D. 急性心脏压塞 E. 张力性气胸

39、原发性脑损伤是指头部外伤时立即发生的脑损伤，临床主要包括（ ACDE ）

- A. 脑震荡 B. 脑水肿 C. 脑挫裂伤 D. 脑血肿 Z. 脑干损伤

40、急性心源性肺水肿与 ARDS 具有鉴别意义的是前者具有：（ ADE ）

- A. 端坐体位 B. 发绀明显 C. X 线胸片呈毛玻璃样改变
- D. PAWP 显著提高 E 利尿药使用效果较好

41、对中毒毒物的抗毒能力多遵循下列哪些规律：（ ABCE ）

- A. 老年、儿童低于青、中年成人 B. 女性常低于男性
- C. 身体衰弱、疾病罹患者低于身体强健者
- D. 机体免疫能力差者低于免疫能力强者的
- E. 对某一毒物而言，敏感者抗毒能力低于不敏感者

- 42、多发伤中可迅速致死又可迅速逆转的 3 种情况是：（ CDE ）
- A. 颅内高压 B. 脑疝 C. 通气障碍 D. 循环障碍 E. 未控制的大出血
- 43、失血性休克早期代偿期反应有（ ABCDE ）
- A. 醛固酮分泌增加 B. 肝、脾和皮肤血管收缩 C. 组织间液移向血管内 D. 心率加快 E. 血管加压素分泌增加
- 44、 β —受体阻滞剂治疗绝对禁忌证有哪些（ ABCDE ）
- A. 严重的左心衰和肺水肿 B. 心动过缓 C. 末梢循环差
- D. 低血压 E. 二度或三度房室传导阻滞
- 45、关于中暑的治疗，以下正确的是（ ABCDE ）
- A. 体内降温 B. 体外降温 C. 药物降温 D. 监测尿量和体温 E. 对症治疗
- 46、需与过敏性休克相鉴别的是（ DE ）
- A. 感染性休克 B. 失血性休克 C. 心源性休克 D. 血管抑制性休克 E. 神经源性休克
- 47、扩血管活性药是（ AD ）
- A. 硝酸甘油 B. 阿拉明 C. 多巴酚丁胺 D. 酚妥拉明 E. 新福林
- 48、现场保持气道通畅的措施错误的（ BE ）
- A. 拉直气道 B. 俯卧位 C. 清除口腔异物 D. 排出气管内异物 E. 头颈屈曲
- 49、呼吸骤停的原因有（ ABCDE ）

A 创伤 B. 会厌炎 C. 心肌梗死 D. 卒中 E. 吸入烟雾

50、急性肾衰竭高钾血症最有效的处理方法是(ABD)

A. 限入水量, 使中心静脉压维持在 6~10cmH₂O 之间

B. 血液透析 C. 注意补镁 D. 静脉缓慢注射钙剂 E. 服用利尿剂安体舒通

51、使用硝普钠可能出现的并发症(ABCDE)

A. 低血压 B. 头痛 C. 呕吐 D. 氰化物中毒 E. 腹痛

52、休克失代偿期表现有(BCDE)

A. 四肢苍白 B. 尿量明显减少 C. 神志淡漠 D. 血压极低
E. 皮肤粘膜发绀

53、关于吸入氧气浓度的说法下列哪些正确(ABCDE)

A. 机械通气 1 小时后根据血气分析调节 FiO₂

B. COPD 患者一般 FiO₂ 在 40% 左右

C. ARDS 患者一般为 60%~100%

D. 原发病变不在肺部患者, FiO₂<30%

E. 如果吸入气氧浓度>60%而 PaO₂ 仍低于 80mmHg, 可加用 PEEP

54、急性腐蚀性胃炎是由于吞服(ABE)

A. 硝酸 B. 盐酸 C. 水杨酸 D. 亚硝酸盐 E. 硫酸

55、溶栓的禁忌证有哪些(ABD)

A. 胸痛超过 24 小时 B. 颅内出血 C. 低血压 D. 血压>24Kpa(180mmHg)
E. 心动过速

56、CO 中毒诊断依据(CDE)

A. 多汗 B. 瞳孔缩小 C. CO 接触史 D. 突然昏迷 E. 皮肤、粘膜呈樱桃红

57、低温相关的副作用有哪些(BCD)

A. 大脑代谢率降低 B. 心排量降低 C. 感染的易感性增加
D. 血液粘滞度增加 E. 心肺复苏后神经系统功能的恢复

58、心肺复苏可出现哪些并发症(ABCDE)

A 脂肪栓子 B. 肝脾撕裂伤 C. 血胸 D 胃扩张 E. 肋骨骨折

59、休克的治疗措施有(ABCDE)

A. 处理原发病因 B 补充血容量 C. 纠正代谢紊乱 D. 改善心功能
E. 改善微循环

60、院前急救的任务(ABCDE)

A. 平时呼救的患者 B. 灾害或战时的遇难者 C. 特殊人物时的救护值班
D. 通讯网络中起枢纽任务 E. 急救知识的普及

61、复苏的生存链包括以下几个环节(ABCDE)

A. 早期心肺复苏 B. 早期求救 C. 早期识别 D. 早期高级心血管生命支持
E. 早期除颤

62、肾上腺皮质激素用于治疗休克的药理机制(ABCDE)

A. 增加心搏量 B. 稳定补体系统 C. 抑制垂体 β -内啡肽的分泌
D. 抑制花生四烯酸代谢 E. 维持细胞壁、细胞膜、溶酶体膜的稳定性

63、下列哪些情况应使用硝酸甘油(DE)

A. 心动过缓 B. 右室心肌梗死 C. 严重的心动过速

D. 心绞痛 E. 心肌梗死相关得充血性心衰

64、心脏骤停的诊断标准应除外(CD)

A. 大动脉摸不到搏动 B. 瞳孔散大 C. 心音遥远 D. 抽搐

E. 神志突然丧失

65、急性冠状动脉综合症不包括哪些(AE)

A. 稳定型心绞痛 B. 不稳定型心绞痛 C. Q 波型 AMI D. 非

Q 波型 AMI E. 隐匿性冠心病

66、下列理化因素引起的损伤需氧疗的为(BC)

A. 有机磷农药中毒 B. CO 中毒 C. 高原病 D. 中暑 E. 冻僵

67、下列哪些情况应选非同步电复律(BC)

A. 室上性心动过速 B. 心室颤动 C. 无脉性室性心动过速

D. 心房扑动 E. 心房颤动

68、地震现场的特点(ABCDE)

A. 遭灾面积大、破坏严重 B. 次灾害多、灾情复杂而严重

C. 伤亡人数较多 D. 现场危险大 E. 需要综合救援

69、解除气道梗阻可采取的方法有(ABCDE)

A. 腹部冲击法 B. 胸部冲击法 C. 手指清除异物法

D. 舌上颌上提法 E 启动急救医疗服务体系，行心肺复苏

70、急性心肌梗死后机械并发症是(ABE)

A 乳头肌断裂 B. 室壁瘤形成 C. 心脏压塞 D. 附壁血

栓形成 E. 室间隔穿孔

71、失血性休克的处理原则(ABCE)

- A. 补充血容量 B. 尽快止血 C. 根据微循环状态, 选择合适的血管活性药 D. 使用强心剂 E. 对难以暂时止血者边补充血容量, 边进行根本止血措施

72、一氧化碳中毒治疗措施是(ABCE)

- A 纠正缺氧 B. 防治脑水肿 C. 对症治疗 D. 尽早用亚甲蓝 E. 离开中毒环境

73、胸外按压技术的注意事项是(ABCE)

- A. 手掌根部长轴与胸骨长轴确保一致 B. 保证手掌全力压在胸骨上
C. 肘关节伸直 D. 放松时双手要完全离开胸壁 E. 按压方向与胸骨垂直

74、关于去甲肾上腺素应用的适应症不正确的是(CDE)

- A. 严重低血压 B 周围血管低阻力 C. 低血容量性休克早期
D. 急性呼吸衰竭早期 E. 重型颅脑外伤昏迷期

75、心肺复苏后, 下列哪些情况下心跳可能再次停止(ABCD)

- A. 脉压小 B. 血压低 C. 心律不齐 D. 呼吸交换量不够 E. 肌张力异常

76、控制躁动可选用的药物有(ABCDE)

- A. 巴比妥酸盐 B. 安定 C. 苯妥英钠 D. 苯巴比妥钠 E. 吗啡

77、急性心肌梗死并心源性休克应用血管扩张剂可能有益的指征是(ABCE)

- A 补足血容量后, 收缩压稳定保持在 100mmHg B. 左室充盈压显著

增高 C. 心排量持续降低 D. 附壁血栓形成 E. 合并室间隔穿孔

78、下列哪些因素能促发晕动病(ABCDE)

A. 通风不良 B. 睡眠不足 C 过度疲劳 D. 饱餐 E. 不悦气味

79、下列可以造成心肌需氧量增加的药物应除外哪些(BDE)

A. 肾上腺素 B. 血管加压素 C. 去甲肾上腺素 D. 硝普钠 E. 吗啡

80、导致致命性心律失常的常见基础病变是(ABDE)

A. QT 间期延长综合征 B. 冠心病 C. 房颤 D. 低钾血症 E. 服用奎尼丁

81、高钾血症的心电图表现有(ABDE)

A. T 波高尖 B. QRS 波增宽 C. PR 间期缩短 D. P 波低平 E. 室性异位节律

82、低血容量性休克的特点(ABDE)

A 低血压 B. 低中心静脉压 C. 高心排出量 D. 低心排出量 E. 低外周静脉压

83、下列哪些注意事项有助于消除或预防气道梗阻(ABDE)

A. 避免酗酒 B. 将食物切碎，细嚼慢咽
C. 对较小的孩子不要给需要仔细咀嚼的食物
D. 将异物放在儿童拿不到的地方
E. 儿童口含食物时不要行走、跑或玩耍

84、右室心肌梗死的临床表现有(ABCDE)

- A. 颈静脉怒张 B. Kussmanl 征 C. 低血压 D. 肝脏肿大
E. 下肢水肿

85、气道梗阻需与下列哪些急症鉴别(ABCDE)

- A. 药物过量 B. 脑卒中 C. 心脏病发作 D. 惊厥或抽搐
E. 虚脱

86、判断失血性休克的主要依据有(ACDE)

- A. 血压下降的幅度 B. 精神状态 C. 脉压的变化程度
D. 脉搏增快程度 E. 失血量占全身血容量的比例

87、电击可导致的并发症和后遗症是(ABCDE)

- A. 室性心律失常 B 胃肠道出血 C. 烧伤处细菌感染 D. DIC
E. 神经源性肺水肿

88、外伤后常用的止血方法有：(ABCDE)

- A 指压止血法 B 包扎止血法 C 填塞止血法 D 止血带止血法
E 加压曲肢止血法

89、中暑的治疗(ADE)

- A. 冷水擦浴 B. 37℃常温腹膜透析 C. 氯丙嗪静点
D. 盐冰水直肠灌洗 E. 20℃生理盐水血液透析

90、急性中毒患者处于昏迷状态下不宜采用(AC)

- A. 催吐 B. 洗胃 C. 50%硫酸镁导泻 D. 灌肠 E. 吸氧

91、杀虫剂污染眼部后，可用下列哪种液体冲洗眼部(AE)

- A. 0.9%生理盐水 B. 肥皂水 C. 热水 D 高锰酸钾(1:5000)

E. 2%碳酸氢钠

92、海水淹溺时，其水电解质紊乱是(ACDE)

- A. 严重低血容量 B. 血液稀释 C. 血钠增高 D. 镁浓度增加
E. 血浆蛋白减少

93、尖端扭转性室性心动过速的治疗原则(ABCD)

- A 补镁 B. 补钾 C. 电超速起搏 D. 异丙肾上腺素 E. 电复律

94、阿托品抢救有机磷杀虫药中毒治疗有效的依据是(ABCDE)

- A. 颜面潮红 B. 心率增快 C. 瞳孔较前扩大 D. 肺部湿罗音减少或消失
E. 皮肤干燥

95、关于电击伤的治疗，正确的是(ABCDE)

- A. 首先应切断电源 B. 电击的有效治疗在于心肺脑复苏
C. 发生前臂腔隙综合征时应进行减压术 D. 积极防治急性肾衰竭
E. 对于广泛组织烧伤，肢体坏死和骨折者，应请外科医师进行相应外科处理

96、静脉应用硝酸甘油的不良反应有(ABCDE)

- A. 心动过速 B. 低血压 C. 反常的心动过缓 D. 头痛
E. 低氧血症

97、异丙肾上腺素的适应证(BD)

- A. 低血压 B. 心动过缓 C. 心脏停搏 D. 尖端扭转型室速
E. 左心功能衰竭

98、下列哪种中毒可引起瞳孔缩小(BC)

A. 阿托品 B. 有机磷杀虫药 C. 吗啡 D. 甲醇 E. 肾上腺素

99、预防休克的措施有(ABCD)

A. 固定骨折 B. 改善心功能 C. 使用抗生素控制感染

D. 补充血容量 E. 不明原因的急腹症静注哌替啶止痛

100、用于治疗氰化物中毒的是(ABC)

A. 亚甲蓝 B. 亚硝酸盐 C. 硫代硫酸钠 D. 纳洛酮 E. 二巯丙醇

101、可导致复苏后综合征的致病因素有(BCDE)

A. 贫血 B. 再灌注损伤 C. 脑中毒 D. 凝血功能障碍
E. 无再灌注

102、低镁血症的心电图改变有(ABCDE)

A. QT 和 PR 间期延长 B. 胸前导联低平或倒置 C. ST 段压低
D. T 波倒置 E. 尖端扭转性室性心动过速

103、关于正常状态下微循环错误的是(BCD)

A. 微动脉平滑肌舒张 B. 微动脉平滑肌收缩 C. 直接通路开放
D. 动静脉短路开放 E. 组织间的毛细血管约 20% 交替开放

104、符合感染性休克低排高阻型特点下列哪些是正确的(ABCDE)

A. 常由 G—杆菌感染 B. 回心血量减少 C. 内毒素和代谢产物抑制心肌，心排量减少 D. 微动、静脉收缩，动静脉短路开放
E. 释放类脂多糖蛋白复合体，刺激机体分泌儿茶酚胺

105、过敏导致的心脏骤停的治疗措施包括(ABCDE)

A. 大剂量静脉注射肾上腺素 B. 使用阿托品及纠正低血容量

C. 皮质醇治疗 D. 延长心肺复苏时间 E. 静脉注射抗组胺药

106、休克微循环扩张期，可发生(ABCD)

A. 毛细血管栓塞 B. 血细胞比容增加 C. 血 PH 值下降
D. 皮肤粘膜花斑 E. 四肢苍白

107、心肺复苏后治疗的近期目标是(ABCE)

A. 提供心肺功能的支持，以满足组织灌注，特别是对大脑的灌注
B. 及时将院前心脏骤停患者转运医院急诊科，再转运 ICU 病房
C. 完善治疗措施
D. 对较小的孩子不要给需要仔细咀嚼的食物
E. 及时明确诊断心脏骤停可能的原因

108、判断失血性休克患者是否继续出血，应反复检查的项目有(BCDE)

A. 出、凝血时间 B. 血红蛋白 C. 血小板计数 D. 血细胞比容
E. 红细胞计数

109、关于低镁血症的原因下列选项正确的是(ABCDE)

A. 甲状腺功能低下 B. 低体温 C. 糖尿病酮症酸中毒
D. 高钙血症 E. 甲状腺功能亢进

110、治疗蛇毒咬伤可用(ABCDE)

A. 伤口清创 B. 抗蛇毒血清 C. 绷扎伤口上方 D. 糖皮质激素
E. 抗生素

111、感染性休克的治疗包括(ABCDE)

A. 脏器循环灌注充足 B. 正性肌力药 C. 静脉碳酸氢盐

D. 血管活性药 E. 抗生素

112、决定经胸电阻抗的因素包括(ABCDE)

A. 除颤器置于皮肤上的压力 B. 电极片大小
C. 除颤次数和时间间隔 D. 呼吸时相 E. 能量选择

113、关于撤离呼吸机的生理指标下列哪些正确(BC)

A. 自主呼吸潮气量 $<7.5\text{ml/kg} \sim 10\text{ml/kg}$
B. 静息每分钟通气量 $<10\text{L}$, 最大通气量 ≥ 2 倍静息通气量
C. 最大吸气压力 $>-1.96\text{Kpa}$
D. 肺活量 $<10 \sim 15\text{ml/kg}$
E. 短暂停用呼吸机后 $\text{PaCO}_2 > 6.0 \sim 7.33\text{kpa}$, $\text{FiO}_2 = 100\%$, $\text{PaCO}_2 > 4\text{kPa}$

114、气体交换不良的体征包括(ABCDE)

A. 发绀 B. 无效咳嗽 C. 呼吸困难加重 D. 吸气时
出现高调嗓音 E. 乏力

115、感染性休克时血压低,但中心静脉压高提示(ACE)

A. 血容量相对过多 B. 容量血管过度收缩 C. 心功能不全
D. 血容量不足 E. 肺循环阻力增大

116、现场抗休克裤的使用,除外下列哪些(ABD)

A. 血气胸 B. 高血压 C. 下肢软组织出血 D. 心脏压塞
E. 骨盆骨折

117、下列哪些人员是第一类救助人员(ABCDE)

A. 警察 B. 船员 C. 运动员领队 D. 保安人员 E. 消防队员

118、下列可暂停心肺复苏的情况是(ABCE)

- A. 气管插管时 B. 电击除颤时 C. 转运途中出现问题时
D. 上下楼时 E. 启动急救医疗服务系统时

119、关于中度冻僵的临床表现正确的是(BC)

- A. 表情疲乏、健忘 B. 表情淡漠，精神错乱
C. 心电图显示 PR、QRS 综合波和 QT 间期延长
D. 常出现心室颤动 E. 出现僵死样面容

120、《突发公共卫生事件应急条例》规定，医疗卫生机构应当对因突发公共卫生事件致病的人员提供什么服务？(ABD)

- A、医疗救护 B、现场救援 C、技术调查
D、必要时将病人转送到指定医疗机构 E. 以上都对

121、不属于超高电压的是(BCE)

- A. 雷击 B. 电流 30 万 A C. 电压 2000V D. 电压 10000 万 V
E. 电压 380V

122、如在充盈压正常的情况下仍持续存在低血压和低血流灌注，需要给予什么药物(ABCE)

- A. 糖皮质激素 B. 血管收缩药 C. 血管舒张药 D. 利尿药
E. 正性肌力药物

123、下列哪些药物可用于治疗心脏骤停(ACE)

- A. 肾上腺素 B. 阿托品 C. 5%NaHCO₃ D. 钙剂 E. 多巴胺

124、感染性休克的处理原则(BCDE)

- A. 使用强心剂 B. 应用抗生素 C. 尽快清除感染源 D. 选择合适血管活性药
E. 补充血容量

125、经口对口呼吸时传播的细菌和病毒有(DE)

- A. 巨细胞病毒 B. 艾滋病病毒 C. 肝炎病毒
- D. 结核杆菌 E. 幽门螺杆菌

126、失血性休克补充血容量时，输液的量和速度应根据(ABCE)

- A. 失血量 B. 血压 C. 尿量 D. 脉搏 E. 中心静脉压

127、关于高钾血症的病因正确的有(ABCDE)

- A. 高钾性周期性瘫痪 B. 肌肉分解 C. 假性低钾血症
- D. IV 型肾小管酸中毒 E. 使用非甾体类消炎药

128、关于高原病的发病机制(ABCDE)

- A. 大脑皮质脑细胞最易受损
- B. 动脉血氧分压降低可发生呼吸性碱中毒
- C. 可致肺源性心脏病 D. 可致高血红蛋白血症
- E. 可致血液粘稠度升高

129、可选择的气管导管包括(ABC)

- A. 食管气管导管 B. 喉罩气道 C. 咽气管导管 D. 鼻咽
- 气道 E. 口咽气道

130、高镁血症的心电图表现(ABCDE)

- A. PR 间期和 QT 间期延长 B. QRS 波时限延长 C. P 波振幅减低
- D. 完全性房室传导阻滞或心脏停搏 E. T 波峰减低

131、国际 ACLS 规定的心脏骤停前情况为(ABCDE)

- A. 有症状的心动过缓 B. 急性肺水肿 C. 急性冠状动脉综合征
- D. 急性缺血性脑卒中 E. 稳定及不稳定的心动过速

132、心电图上表现为宽 QRS 波心动过速为(ABCDE)

- A. 伴房室传导阻滞的房扑 B. 室性心动过速 C. 窦性心动过速伴室内传导阻滞 D. 房性心动过速伴室内传导阻滞 E. 结性心动过速伴室内传导阻滞

133、有哪些急救止血法(ACDE)

- A. 手压止血法 B. 用铁丝扎止血法 C. 加压包扎止血法
D. 强屈关节止血法 E. 填塞止血法

134、有机磷杀虫药中毒的机制，不正确的是(ABC)

- A. 干扰细胞膜和细胞器生理功能 B. 受体竞争 C. 麻醉作用
D. 缺氧 E. 抑制酶的功能

135、张力性气胸系指(CDE)

- A. 胸腔抽气后压力不再上升 B. 肺萎陷轻 C. 纵膈移位明显
D. 胸腔压力成正压 E. 常采用胸腔闭式引流

136、属于神经毒类的毒蛇是(BD)

- A. 竹叶青 B. 银环蛇 C. 五步蛇
D. 金环蛇 E. 五步蛇

137、急性缺血性脑卒中溶栓治疗的禁忌证为(ABCDE)

- A. 活动性内脏出血 B. 血小板计数 $<100 \times 10^9 / L$ C. 癫痫发作
D. 疑有蛛网膜出血 E. 颅内新生物

138、改善心排出量和血压的药物对心血管系统的影响主要在以下几个方面(ABCDE)

- A. 对周围阻力血管紧张度的影响 B. 对心肌收缩力的影响

- C. 对心脏变时性的影响
- D. 对心脏舒张末压的影响
- E. 对毛细血管紧张度的影响

139、钙通道阻滞剂适应证(ABCD)

- A. 经房室结的折返性心动过速
- B. 心房扑动
- C. 频发房性早搏
- D. 心房颤动
- E. 严重左心功能衰竭

140、社会安全事件发生后，人民政府应当立即的应急处置措施为(ABCDE)

- A. 强制隔离使用器械相互对抗或者以暴力行为参与冲突的当事人，妥善解决现场纠纷和争端，控制事态发展。
- B. 对特定区域内的建筑物、交通工具、设备、设施以及燃料、燃气、电力、水的供应进行控制。
- C. 封锁有关场所、道路，查验现场人员的身份证件，限制有关公共场所内的活动。
- D. 加强对易受冲击的核心机关和单位的警卫，在国家机关、军事机关、国家通讯社、广播电台、电视台、外国驻华使领馆等单位附近设置临时警戒线。
- E. 法律、行政法规和国务院规定的其他必要措施。

141、自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后，人民政府可以采取的应急处置措施有(ABCDE)

- A. 组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。
- B. 迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，

实行交通管制以及其他控制措施。

C. 立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施，向受到危害的人员提供避难

场所和生活必需品，实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施。

D. 禁止或者限制使用有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施。

E. 依法从严惩处囤积居奇、哄抬物价、制假售假等扰乱市场秩序的行为，稳定市场价格，维护市场秩序。

142、CO 中毒时最易受损害的脏器除外(BDE)

A. 心脏 B. 肺 C. 脑 D. 肾 E. 胰腺

143、经皮起搏器治疗的适应症有哪些(ABCD)

A. 血流动力学不稳定的心动过缓 B. 二度 II 型房室传导阻滞
C. 双束支阻滞 D. 左前分支阻滞 E. 一度房室传导阻滞

144、利多卡因可用于(ABCE)

A. 单支病变的急性心肌梗死或心肌缺血出现频发室性期前收缩
B. 电除颤和给予肾上腺素后仍表现为室颤或无脉性室速
C. 控制已引起血流动力学改变的室性期前收缩
D. 预防急性心肌梗死患者发生室性心律失常
E. 血流动力学稳定的室速

145、下列哪些情况下可用钙剂治疗(ABE)

A. 高血钾 B. 低血钙 C. 心脏骤停 D. 低血压 E. 钙

通道阻滞剂中毒

146、对急性冠状动脉综合征高危患者积极的药物治疗包括哪些
(ABCDE)

- A. 肝素 B. 阿司匹林 C. 硝酸甘油
D. β 受体阻滞剂 E. 血小板 IIb/IIIa 拮抗剂

147、突发事件分级为(ACDE)

- A. 特别重大 B. 比较重大 C. 重大 D. 较大 E. 一般

148、发生晕车、晕机或晕船时，可给予(ACE)

- A. 口服苯海拉明 B. 口服 VitB120mg C. 口服地西泮 2.5mg~5mg
D. 口服西咪替丁 0.2g E. 口服甲氧氯普胺 (胃复安)10mg~20mg

149、下列哪些是怀疑脊柱损伤的可能(ABCDE)

- A、机动车事故中的受伤者 B、超过站立高度的地方坠落
C、外伤后颈部或背部疼痛 D、外伤后主诉肢体麻木无力感
E 高处坠落物砸伤腰背部

150、有关雷击伤说法哪些是正确的(ABDE)

- A、雷击伤可出现皮肤闪电纹 B. 可造成心跳停止
C、雷击放电时间约为 100~500ms D. 可造成鼓膜穿孔，视网膜剥离
E、跨步较大的动物容易被击伤

151、以下哪项为心电图上诊断室性心动过速的有力证据：(ABCD)

- A. 室性夺获 B. QRS 波群增宽在 0.14 秒左右，继发 ST-T 改变
C. 室性融合波 D. 心室率超过 100 次，节律整齐或轻度不整齐
E. 以上均不正确

152、下列哪些项目属于脑膜刺激征：（ A C ）

A. Kernig 征 B. Lasegue 征 C. Brudzinski 征 D. Babinski 征
E. Gordon 征

153、颅内压增高的主要症状哪些是正确的（ ACD ）

A. 头痛 B. 恶心 C. 呕吐 D. 意识障碍 E. 以上都不正确

154、痛风的临床表现（ ABCD）

A. 痛风性关节炎 B. 痛风结节 C. 尿酸结石
D. 痛风性肾病 E. 以上都不正确

155、早期有机磷杀虫剂中毒有哪些中毒症状（ ABC ）

A. 毒蕈碱样症状 B. 烟碱样症状 C. 中枢神经系统症状
D. 反跳 E. 中间型综合征

156、食物中毒的特征（ ABC ）

A. 突然暴发，潜伏期短 B. 多呈胃肠道症状的临床表现
C. 多为集体发病 D. 发病者均与食用某种食物有关，停止供
食所有食品 E. 以上都正确

157、糖尿病高渗性昏迷的临床特点（BCDE）

A. 多见于 I 型糖尿病患者 B. 2 / 3 患者发病前无糖尿病病史
或仅有轻度糖尿病 C. 患者多有肾功能不全
D. 血浆渗透压 $>350\text{mOsm/L}$ ，血钠增高或正常，血糖常 $>33.3\text{mmol/L}$
E. 临床上有神经系统症状，如局部性抽搐、偏瘫、失语，Babinski
征阳性等。

158、恶性高血压的临床特点下面哪些不正确(BCDE)

- A. 发病急骤，多见于老年人
- B. 血压显著升高，舒张压持续 $>130\text{mmHg}$
- C. 头痛，视物模糊，眼底出血、渗出和视盘水肿
- D. 肾脏损害突出，出现持续蛋白尿、血尿、管型尿，并可伴有肾功能不全
- E. 进展迅速，如不给予治疗，预后不佳

159、心跳骤停可分为哪几种类型(ABC)

- A. 心搏极弱
- B. 心室纤维颤动
- C. 心跳完全停止
- D. 无意识抽搐
- E. 以上都不正确

160、糖皮质激素使用的绝对禁忌证(ABCDE)

- A. 严重精神病史
- B. 显性糖尿病合并骨质疏松
- C. 严重高血压
- D. 未控制的严重感染
- E. 青光眼

161、毒蛇咬伤的伤口处理原则(ACDE)

- A. 绷扎
- B. 清创
- C. 封闭
- D. 用抗生素
- E. 制动

162、心房颤动时列哪些说法是正确的(ABCE)

- A. P 波消失
- B. 各导联中(V1 导联最显著)出现一系列大小不同、形态各异、间隔不匀、频率为 $300\text{次/min}\sim 350\text{次/min}$ 的颤动波(f 波)
- C. 心室节律完全不规则
- D. 心率小于脉率
- E. 第一心音强弱不等

163、高压电引起典型的电接触伤特点有哪些(BCD)

- A. 面积大，损伤深
- B. 一处进口，多处出口
- C. 肌肉组织常呈夹心样坏死
- D. 可造成血管壁变性坏死或血管栓塞
- E. 以上

都不对

164、喉阻塞的常见病因（ABCDE）

A. 炎症 B. 外伤 C. 肿瘤 D. 声带瘫痪 E. 先天性畸形

165、冠心病心绞痛发作时胸痛的特点下面正确的有：（ABCD）

A. 主要在胸骨体上段或中段之后，可波及心前区，常放射到左肩、左臂内侧或颈咽或颌部 B. 胸痛为压迫、发闷或紧缩性，也可有烧灼感 C. 发作常由体力劳动或情绪激动、饱食、寒冷、吸烟、心动过速、休克等诱发 D. 疼痛常发生于劳动或情绪激动的当时 E. 一般持续约 30 分钟以上

166、梅尼埃病的常见临床症状（ABCD）

A. 眩晕 B. 耳鸣 C. 耳聋 D. 恶心呕吐 E. 以上都不正确

167、食管异物的并发症（ABCDE）

A. 食管穿孔 B. 颈部皮下气肿或纵隔气肿 C. 食管周围炎、食管周围脓肿及纵隔脓肿 D. 大血管破损 E. 食管气管瘘。

168、胸腔穿刺的目的是什么（ABCD）

A. 确定胸腔内有无液体，通过穿刺液化验及病理检查，确定积液的性质或病因 B. 通过抽液或抽气，减轻胸腔内压迫 C. 胸腔内注入药物治疗脓胸 D. 气胸治疗 E. 以上都不正确

169、神经性头痛的临床特点（ABDE）

A. 头痛部位不固定，或弥漫性 整个头部，性质多样化，多为胀痛、晕痛 B. 头痛常年存在，头痛的轻重常受患者情绪影响，紧张、疲劳、失

眠、气候变化时头痛加重

- C. 患者常合并大脑皮质功能亢进症状，
- D. 可伴有心悸、手颤、多汗等自主神经功能紊乱症状
- E. 神经性头痛常见于神经症，脑震荡后遗症及更年期综合征等患者。

170、有关洋地黄的主要适应证与禁忌证，下列哪些是正确的：（ ABE ）

- A. 适用于阵发性室上性心动过速
- B. 常用于心房颤动尤其是快速性心房颤动
- C. 预激综合征伴心房颤动或扑动 B 也可使用洋地黄
- D. 肥厚梗阻型心肌病而无心房颤动或明显心力衰竭者禁用
- E. 心房扑动

171、感染性休克的抢救原则（ ABCDE ）

- A. 补充有效循环血量 B. 适当使用血管活性药物 C. 积极控制感染
- D. 早期应用糖皮质激素 E. 纠正水、电解质和酸碱紊乱，防治并发症及支持治疗

172、心脏停搏的临床表现下列正确的有 （ ABCDE ）

- A. 心音消失 B. 大动脉脉搏触不到、血压测不出
- C. 意识突然丧失或伴有短阵抽搐，抽搐常为全身性，持续时间长短不一，可长达数分钟
- D. 呼吸断续，叹息样，继之呼吸停止
- E. 瞳孔散大，二便失禁

173、机械通气的主要作用 （ BCD）

- A. 改善通气功能，维持适当肺泡通气，纠正严重的呼吸性碱中毒
- B. 改善气体交换功能，维持有效的气体交换，

- C. 减少呼吸功的消耗，使呼吸肌疲劳得以缓解
- D. 预防性机械通气，用于疾病状态或术后呼吸衰竭和肺不张的预防
- E. 以上都不正确

174、使用呼吸机的主要并发症下列说法正确的有（ ABCD ）

- A. 通气过度 B. 呼吸道阻塞 C. 呼吸机相关性肺炎 D. 气压伤
- E. 以上都不正确

175、复苏有效的指征正确的是（ ABCD ）

- A. 心电图出现交接区、房性或窦性心律并能听到规则而持续的心脏搏动音
- B. 有可触之的大动脉搏动
- C. 面、口唇颜色由发绀转为红润
- D. 瞳孔变化由小变大，对光反应逐渐恢复
- E. 出现及功能恢复的迹象，如患者手脚开始抽动、挣扎、肌张力增加、吞咽动作出现和自主呼吸恢复等。

176、多发伤的临床特点有哪些（ ABCE ）

- A. 应激反应严重、伤情变化快、死亡率高 B. 伤势重、休克发生率高
- C. 损伤部位多 D. 表面伤情不易掩盖潜在的危重情况
- E. 伤后并发症和感染发生率高

177、碳酸氢钠的不良反应有哪些（ ACDE ）

- A. 降低冠状动脉灌注压；
- B. 细胞外酸中毒，氧解离曲线左移，氧释放减少；
- C. 高钠血症和高渗血症；

D. 产生大量的一氧化碳，弥散到心肌细胞和脑细胞内，引起反常性酸中毒；

E. 加重中枢神经系统酸中毒

178、脑死亡的诊断要点 （ ABCDE ）

A. 深度昏迷(GCS 记分为 3 分) B. 无自主呼吸 C. 瞳孔散大固定 D. 脑电图呈一直线 E. 脑干反射消失。

179、机械辅助通气的适应证 （ ABCDE ）

A. 心脑肺复苏 B. 各种中枢神经系统疾病所致的呼吸衰竭
C. 神经肌肉疾病引起的呼吸衰竭
D. ARDS 等非心源性肺水肿及肺炎、支气管哮喘等引起的呼吸衰竭；
E. 围术期用于预防呼吸衰竭和肺不张。

180、急性中毒的急救原则是(BCDE)

A. 立即脱离中毒现场，至下风口
B. 有心跳、呼吸骤停者，先行心肺脑复苏
C. 详询病史，迅速确定诊断，估计中毒程度
D. 尽快排除尚未吸收的毒物，阻止毒物的进一步吸收
E. 对已被吸收的毒物，需尽快选择有效药物中和毒素，促进排泄

181、中心性发绀、周围性发绀的特点：（ AB ）

A. 中心性发绀是由于心肺疾病致动脉血氧饱和度降低而引起的发绀
B. 周围性发绀：是由于周围循环障碍所致的发绀
C. 周围性发绀特点为全身性发绀，除四肢与颜面外，还累及粘膜与躯干的皮肤，但皮肤是温暖的

D. 中心性发绀特点是常出现于肢体的末梢与下垂部位，如肢端、耳垂、口唇等处，发绀部位皮肤是冰冷的

E. 以上都不正确

182、四肢骨折固定目的是什么 （ AB ）

A. 避免骨折端在搬运时，由于位置移动而更多地损伤软组织、血管、神经或内脏

B. 骨折固定后即可止痛，有利于防止休克

C. 固定后不用再进一步治疗

D. 可以缩短治疗周期

E. 以上都正确

183、开放性气胸的治疗方法哪些是正确的 （ ABCDE ）

A. 急救时首先应用无菌敷料封闭伤口，然后穿刺抽气

B. 纠正休克、输液、输血、给氧

C. 清创缝合伤口，行胸膜腔闭式引流

D. 如有胸腔内脏器损伤则需剖胸探查

E. 抗生素治疗，预防感染。

184、下面有关右心功能不全的体征，哪些是错误的 （ BCDE ）

A. 颈静脉怒张或充盈是右心功能不全的晚期表现

B. 肝脏肿大和压痛，进展快的右心衰竭，尚可出现黄疸伴转氨酶增高。长期右心衰竭，可导致心源性肝硬化

C. 胸水和腹水 D. 发绀

E. 在胸骨左缘第 3—第 4 肋间闻及舒张期奔马律。右心室显著扩大者

在三尖瓣区闻及收缩期吹风样杂音伴吸气时增强。

185、精神分裂症的症状标准下面有几项是正确的 (ABCDE)

- A. 联想障碍 B. 情感障碍
- C. 常以评论性、争论性、命令性幻听的存在，或思维低声，或持续1个月以上的真性或假性幻听 D. 行为障碍 E. 意志消沉、孤僻、离群、懒散、思想贫乏、情感淡漠

186、泥石流发生的条件是(ABDE)

- A. 地形地貌陡峭 B. 大量降雨 C. 邻近大型水库
- D. 山间沟谷地形 E. 山前沟谷地形

187、导致无脉性心脏骤停的常见心律失常有哪些(ACDE)

- A. 室颤 B. 室上性心动过速 C. 无脉性电活动
- D. 心脏停搏 E. 室性心动过速

188、撤销传染病防治紧急措施的条件有(ABCD)。

- A、甲类传染病病人、病原携带者全部治愈
- B、污染的物品及环境已经过消毒等卫生处理;有关病媒昆虫、染疫动物基本消除;
- C、暴发、流行的传染病病种，经过最长潜伏期后，未发现新的传染病病人，疫情得到有效的控制;
- D、乙类传染病病人、病原携带者得到有效的隔离治疗;病人尸体得到严格消毒处理;
- E、以上均不是

189、颅脑外伤病人的院前急救处理应注意哪些方面(ABCDE)

- A. 开放气道和提供足够的氧气 B. 固定病人，限制颈部的运动
C. 适当镇静 D. 详细记录原始资料 E. 开通两路大口径静脉通道

190、《突发公共卫生事件应急条例》对突发公共卫生事件信息发布要求是：(ABCD)

- A. 及时 B. 准确 C. 全面 D. 注意保密 E. 以上都不正确

191、突发公共卫生事件应急处理的意义是 （ ABCDE ）

- A. 控制突发公共卫生事件的扩散蔓延
B. 及时救治突发公共卫生事件中的受害公众
C. 预防突发性公共卫生事件的发生
D. 促进国家公共卫生事业的发展
E. 增强社会公众的健康意识

192、以下哪种情况适用于应用电复律治疗 （ ABCE ）

- A. 室性心动地速伴严重血流动力学障碍
B. 急性心肌梗死合并室性心动过速
C. 扩张型心肌病合并室性心动过速
D. 洋地黄中毒出现室性心动过速
E. 手术中出现室性心动过速

193、截至目前，乙类传染病中新增加了（AC）。

- A、人感染高致病性禽流感 B、炭疽
C、传染性非典型肺炎、 D、黑热病 E、艾滋病

194、法洛四联症同哪几种畸形组成：（ ABD ）

- A. 右室流出道梗阻 B. 室间隔缺损 C. 左心室肥厚

D. 主动脉骑跨 E. 以上都正确

195、下面有关肾病综合征的病理生理改变，正确的是：（ ABCD ）

A. 大量蛋白尿 B. 低蛋白血症 C. 高脂血症 D. 明显水肿
E. 发热

196、能引起急性胰腺炎的药物有 （ ABCD ）

A. 丙戊酸钠 B. 呋塞米 C. 雌激素
D. 糖皮质激素 E. 以上都不正确

197、糖尿病酮症时酮体阳性是指：（ BD ）

A. 乙酸 B. 丙酮 C. 生酮氨基酸 D. β -羟丁酸 E. 以上都是

198、水杨酸类解热镇痛药作用特点，正确的是：（ ABCD ）

A. 能降低发热者的低温 B. 有较强的抗炎作用 C. 有较强的抗风湿作用
D. 对胃肠绞痛有效 E. 无成瘾性和耐用性

199、吸入高浓度可产生“电击式死亡”的有害气体包括：（ AB ）

A. H_2S B. HCN C. SO_2 D. HCl E. 氮氧化物

200、心包积液引起的心脏压塞的主要征象有：（ ACDE ）

A. 颈静脉怒张，静脉压异常升高
B. 血压下降，脉压增大，严重者可导致休克
C. 奇脉 D. 心音减弱、遥远
E. 呼吸困难、端坐呼吸，可有发绀

六、判断题 共 100 题（正确的在括号内标“√”，错误的标“×”）

- 1、腹腔液中和血清淀粉酶升高是胰腺损伤的特异性指标。(×)
- 2、高血压脑病患者多伴发急性肺水肿。(×)
- 3、发现患者呼吸由浅、慢变深、快，然后由深、快变浅、慢，乃至暂停，5~30 秒后周而复始，称为库斯毛尔(Kussmaul)呼吸。(×)
- 4、髋关节中心脱位如受伤时下肢处于轻度内收位，则股骨头向后方移位。(√)
- 5、断肢再植距外伤的时间，一般以 6~8 小时为限。(√)
- 6、老年男性泌尿系统梗阻最常见的原因是膀胱颈硬化。(×)
- 7、溃疡病患者都有上腹痛，出现并发症后其疼痛的节律性丧失。(×)
- 8、骨挫裂伤绝对卧床 2~4 周。(√)
- 9、发生开放性气胸是应立即用无菌纱布覆盖包扎伤口。(√)
- 10、进行性血胸会引起纵隔扑动。(×)
- 11、张力性气胸急救原则首先应气管插管辅助呼吸。(×)
- 12、连枷胸是指多处肋骨骨折。(×)
- 13、张力性气胸不可能出现纵隔扑动。(√)
- 14、脑疝发生后应立即腰椎穿刺引流脑脊液以减轻脑损伤。(×)
- 15、脑震荡颅脑 CT 检查可见点状出血。(×)
- 16、蛛网膜下腔出血的典型表现是突发剧烈头疼、恶心、呕吐，脑膜刺激征阳性。(√)
- 17、酸碱化学烧伤，急救首选消毒剂冲洗。(×)
- 18、浅 II 度烧伤的临床特点是水疱较饱满，有剧痛和感觉过敏，皮

温增高。(√)

19、脉搏扪不到是诊断心脏停搏的指标。(×)

20、急性化脓性腹膜炎的体征中，可出现腹壁静脉曲张。(×)

21、上消化道穿孔最常见的原因是胃十二指肠溃疡。(√)

22、消化道穿孔必有胃十二指肠溃疡病史。(×)

23、腰椎间盘突出症病人一定会出现坐骨神经分布区域感觉、运动和反射障碍。(×)

24、骨折的专有体征包括畸形，骨擦音，反常活动和局部压痛。(×)

25、手部创伤止血时止血带应缚于上臂上 1/3 处。(√)

26、伤侧足呈 90 度外旋畸形的多为股骨颈骨折。(×)

27、处于临床死亡期的病人是可以被复苏的。(√)

28、一般说来，低压电触电常引起心室纤颤。(√)

29、颈部损伤后锁骨下动脉不可结扎。(√)

30、强酸引起的 II 度烧伤，通常不会出现水疱。(√)

31、癫痫与继发性脑干损伤无关。(√)

32、已经出现血压高、脉搏和呼吸减慢的重度急性颅内血肿的病人，当开颅手术时，过快的释放颅内血肿，将导致血压骤降。(√)

33、胸外伤时，多根多处肋骨骨折可考虑应用呼吸肌辅助正压通气。(√)

34、高钾血症心电图最早的变化是 T 波高尖。(√)

35、低钾血症对酸碱平衡的影响是细胞内碱中毒，细胞外酸中毒。(×)

- 36、中心静脉压可以作为评估血容量和左心功能的指标。(×)
- 37、Cushing 溃疡是指脑外伤后继发胃、十二指肠溃疡。(√)
- 38、急性阑尾炎早期上腹部及脐周疼痛是由于内脏神经反射。(√)
- 39、中间清醒期是急性硬膜下血肿的特点。(×)
- 40、急性阑尾炎病人，当腹痛尚未转至右下腹，则脐区和右下腹压痛有诊断意义。(×)
- 41、凡屈氏韧带以上的消化道出血，称为上消化道出血。(√)
- 42、全血胆碱酯酶测定是诊断有机磷中毒和判断其中毒程度的重要指标。(√)
- 43、骨折的整复原则是远端对近端。(√)
- 44、肌肉痉挛是引起骨筋膜室综合征的主要发病机制。(×)
- 45、张力性气胸最确切的诊断依据是胸膜腔穿刺穿出高压气体。(√)
- 46、开放性气胸造成急性循环衰竭的最主要的原因是纵隔扑动。(√)
- 47、动脉导管未闭可以在胸骨右缘第 2 肋间听到连续机器样杂音，向右锁骨下窝或颈背部传导。(×)
- 48、双侧视乳头水肿是颅内压增高的重要体征。(√)
- 49、脑挫裂伤意识障碍以中间清醒期为主要特点。(×)
- 50、颅中窝骨折发生脑脊液耳漏时的处理原则是保持外耳道清洁，引流通畅。(√)
- 51、大脑半球的供血不足的的临床症状包括：耳鸣，失语，一过

性黑朦， 感觉麻木等。(×)

52、创伤失血性休克者，发生急性肝功能损害最常见的原因是应激反应。(×)

53、反应左心室前负荷变化的指标是中心静脉压。(×)

54、气管插管并发症包括： 心律失常， 肺不张， 苏醒延迟， 喉头水肿， 肺部感染等。(×)

55、二尖瓣关闭不全易引起高排量心力衰竭。(×)

56、腕管综合征是正中神经在腕管内受压所致。(√)

57、感染性休克多是革兰阴性杆菌所释放的内毒素引起的内毒素性休克。(√)

58、支气管扩张的主要诊断依据是支气管造影。(√)

59、心电图上未发现正常 P 波，QRS 波群呈室上性型，心室率 114 次/min，节律不规则，据此可以诊断为快速性心房颤动。(√)

60、应用多巴胺静脉滴注治疗心力衰竭，如剂量太大，有可能出现心室早搏。(√)

61、脑震荡是指头部外伤后引起短暂的脑功能障碍而无确定的脑器质改变。(√)

62、有无偏瘫是区别蛛网膜下腔出血和脑出血的重要体征。(√)

63、急性胰腺炎患者出现手指麻木应考虑低钙血症。(√)

64、休克病人的最佳体位是头低足高。(×)

65、腹部透视膈下无游离气体说明胃肠道无损伤。(×)

66、炎症引起的三度喉梗塞应立即行气管切开术。(×)

- 67、氨茶碱有直接兴奋心肌，增加心肌收缩力和心排血量的作用，有扩张冠状动脉，松弛支气管和利尿的作用。（ √ ）
- 68、交替脉、颈静脉充盈、颈静脉回流征的临床意义相同，三者的变化均提示患者有右心功能不全。（ × ）
- 69、排尿中断是膀胱结石的典型症状。（ √ ）
- 70、低钾血症时心电图最特征的改变是 T 波低平并出现 U 波，其次 QRS 波群变窄，PR 间期缩短。（ × ）
- 71、食物中毒可分为细菌性食物中毒、自然毒食物中毒和化学性食物中毒。（ √ ）
- 72、平均动脉压接近舒张压，等于舒张压加 1/4 脉压，低于收缩压。（ × ）
- 73、骨关节脱位的特征是畸形、弹性固定、关节空虚、功能障碍。（ √ ）
- 74、急性肾功能衰竭少尿期患者最常见的死因是高钾血症。（ √ ）
- 75、大量出汗引起的缺水应属等渗性缺水。（ × ）
- 76、变应性鼻炎属 II 型超敏反应。（ × ）
- 77、高压氧下心率增快，心排量增加。（ √ ）
- 78、孕妇发生中度以上一氧化碳中毒时，原则上应作高压氧治疗。（ × ）
- 79、急性化脓性骨髓炎发病后 3~5 天，X 线照片上可见到骨质改变。（ × ）
- 80、糖皮质激素可使肝糖原分解升高、血糖升高。（ √ ）

- 81、只有致热原才能产生输血性发热反应。(×)
- 82、孕妇血液中存在 IgG 血型抗体即有可能引起新生儿溶血病。
(√)
- 83、厌氧菌所致败血症首选头孢类抗生素。(×)
- 84、低血容量性休克发生后首要的治疗措施是纠正休克发生的原因。
(×)
- 85、急性心力衰竭由右心梗塞引起者，治疗的主要措施是溶栓、缩小梗塞范围。 (×)
- 86、心搏骤停的主要依据是意识丧失，反射消失。(×)
- 87、急性肺动脉栓塞的心电图典型改变是 $S_I Q_{II} T_{III}$ (×)
- 88、高压氧治疗时，氧分压越低发生氧中毒的可能性越大。(×)
- 89、当患者一边讲话一边呈鹰爪状抽搐时，此为癫痫大发作的一种形式。(×)
- 90、脑震荡是指头部外伤后半小时内意识能迅速自行恢复。(√)
- 91、枕骨大孔疝的主要症状是早期出现一侧瞳孔扩大。(×)
- 92、原发性动眼神经损伤后一侧瞳孔立即缩小，直接、间接对光反射存在。(×)
- 93、大咯血患者宜高流量给氧以改善缺氧、防止窒息。(×)
- 94、ARDS 患者因缺氧而有肺血管收缩，肺动脉楔压常显著高于正常。
(×)
- 95、对于非心室颤动和非室性心动过速心律失常，电除颤不应作为首选。(√)

96、淡水淹溺所致低氧血症主要机理是肺泡改变了表面张力而萎陷。

(√)

97、用 PEEP 治疗严重 ALI 患者时的气压伤多与所应用的 PEEP 呼吸道压过高有关。(×)

98、上消化道出血停止的最可靠指标是排出的大便由黑色转呈黄色。

(√)

99、髁状突滑出关节窝以外，向前越过关节结节，称为颞下颌关节强直。(×)

100、左心衰患者可出现肺顺应性降低，使呼吸肌做功和耗能增加。

(√)